

# 非小細胞肺癌

## CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                                      | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|---|--------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量   | 投与方法/時間      |    | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | ペメトレキセド<br>生食 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min |    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL   | DIV<br>2hr   |    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |   |              |    | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法を実施できる<br>2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CDDP(75)+PEM(500)+BV(15)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                                      | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|---|--------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量   | 投与方法/時間      |    | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | ペメトレキセド<br>生食 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min |    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL   | DIV<br>2hr   |    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | ババシズマブ<br>生食 15mg/kg<br>100mL               | DIV<br>90min |    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |   |              |    | 1. 4~6コース導入療法終了後、維持療法を実施できる<br>2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CDDP(80)+VNR(25)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                                    | 申請         | 呼内 | 投与スケジュール                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|---|------------|----|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量                                       | 投与方法/時間    |    | 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | ロゼウス<br>生食 25mg/m <sup>2</sup><br>50mL    | DIV<br>全開  |    | ↓                         |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL | DIV<br>2hr |    | ↓                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |   |            |    | 1. PDまで（※術後補助化学療法は4コースまで） |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CDDP(80)+CPT-11(60)/q4W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                                    | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|---|--------------|----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量                                       | 投与方法/時間      |    | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 28 |
| 1       | イリノテカン<br>生食 60mg/m <sup>2</sup><br>250mL | DIV<br>90min |    | ↓           |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    | ↓ |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL | DIV<br>2hr   |    | ↓           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |   |              |    | 1. 4~6コースまで |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CDDP(80)+DTX(60)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                                    | 申請         | 呼内 | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|---|------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量                                       | 投与方法/時間    |    | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | ドセタキセル<br>生食 60mg/m <sup>2</sup><br>250mL | DIV<br>1hr |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL | DIV<br>2hr |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |   |            |    | 1. 4コースまで |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CDDP(80)+GEM(1000)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌          | 申請                             | 呼内           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量             | 投与方法/時間                        |              | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | ゲムシタピン<br>5%Glu | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>30min | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食    | 80mg/m <sup>2</sup><br>250mL   | DIV<br>2hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CDDP(60)+TS-1/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                  | 申請                           | 呼内         | 投与スケジュール |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|-------------------------|------------------------------|------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量                     | 投与方法/時間                      |            | 1        | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | TS-1<br>(エスワンタイホウ配合OD錠) | 80-120mg/body                | PO<br>分2   | ↓↓       | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |   |    |
| 2       | シスプラチン<br>生食            | 60mg/m <sup>2</sup><br>250mL | DIV<br>2hr | ↓        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌           | 申請                            | 呼内         | 投与スケジュール                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |            | 1                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr | ↓                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr | ↓                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |            | 1. PTX投与に際し、レスタミン錠内服<br>2. 4~6コースまで |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CBDCA(AUC6)+PTX(200)+BV(15)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌           | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | ベバシズマブ<br>生食     | 15mg/kg<br>100mL              | DIV<br>90min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. PTX投与に際し、レスタミン錠内服<br>2. 4~6コース導入療法終了後、維持療法(BV)を実施できる |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

## CBDCA(AUC5)+GEM(1000)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌           | 申請                             | 呼内           | 投与スケジュール    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|--------------------------------|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                        |              | 1           | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | ゲムシタピン<br>5%Glu  | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>30min | ↓           |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5<br>250mL                  | DIV<br>1hr   | ↓           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                                |              | 1. 3~6コースまで |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |





## PEM(500)alone/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌  | 申請                   | 呼内    | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|---------|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量     | 投与方法/時間              |       | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | ペメトレキセド | 500mg/m <sup>2</sup> | DIV   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|         | 生食      | 100mL                | 10min |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |         |                      |       | 1. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## Weekly nabPTX(100)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請                   | 呼内    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--------|----------------------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間              |       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | アブラキサン | 100mg/m <sup>2</sup> | DIV   | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    | ↓ |    |  |
|         | 生食     | 50mL                 | 30min |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## Nivolumab(240)/q2W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請         | 呼内      | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|---------|--------|------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間    |         | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| 1       | オブジーボ  | 240mg/body | DIV     | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |
|         | 生食     | 100mL      | 30min以上 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |  |

## Nivolumab(480)/q4W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請         | 呼内      | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--------|------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間    |         | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 28 |  |
| 1       | オブジーボ  | 480mg/body | DIV     | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|         | 生食     | 100mL      | 30min以上 |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## Pembrolizumab(200)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請         | 呼内    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--------|------------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間    |       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | キイトルーダ | 200mg/body | DIV   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|         | 生食     | 100mL      | 30min |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## Pembrolizumab(400)/q6W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請         | 呼内    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--------|------------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間    |       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 42 |  |
| 1       | キイトルーダ | 400mg/body | DIV   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|         | 生食     | 100mL      | 30min |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## Atezolizumab(1200)/q3W

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請          | 呼内    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--------|-------------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間     |       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | テセントリク | 1200mg/body | DIV   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|         | 生食     | 250mL       | 60min |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## Atezolizumab(1200)/q3W adjuvant

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請          | 呼内    | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--------|-------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間     |       | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | テセントリク | 1200mg/body | DIV   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|         | 生食     | 250mL       | 60min |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |        |             |       | 1. 次の条件を全て満たす。<br>①診断時StageⅡ～ⅢA、②プラチナ製剤併用療法による術後補助化学療法を1コース以上行っている。<br>③術後補助化学療法から3～8週間経過している。<br>2. 最大12か月（16か月まで投与可） |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

## TS-1 alone

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌                  | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |
|---------|-------------------------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|---|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量                     | 投与方法/時間      |    | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 28 |   |
| 1       | TS-1<br>(エスワンタイホウ配合OD錠) | 80-120mg/day | PO | 分2  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓ | ↓  | ↓ |
| [条件等]   |                         |              |    | 1. TS-1：4週間投与・2週間休薬<br>2. 原則4週間投与・2週間休薬とするが、休薬基準に該当した場合2週間投与・1週間休薬検討可 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |   |

## UFT術後

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌 | 申請                   | 呼内 | 投与スケジュール        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |
|---------|--------|----------------------|----|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量    | 投与方法/時間              |    | 1               | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ~ |   |
| 1       | UFT    | 250mg/m <sup>2</sup> | PO |                 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓  | ↓ | ~ |
| [条件等]   |        |                      |    | 1. 分2~3投与 2年間継続 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |   |   |

## 3ヨート CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌        | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量           | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |  |  |  |
| 1       | ペメトレキセド<br>生食 | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| 2       | シスプラチン<br>生食  | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| [条件等]   |               |                               |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行<br>2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う<br>3. 点滴開始からCDDP投与終了までに1L以上の経口補水液を摂取<br>4. デカドロンを経口投与 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |

## 3ヨート Pembrolizumab(200)+CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌） | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量            | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |  |  |  |
| 1       | キイトルーダ<br>生食   | 200mg/body<br>100mL           | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| 3       | シスプラチン<br>生食   | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| [条件等]   |                |                               |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行（Pembrolizumab+PEM(500)/q3W）<br>2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う<br>3. 点滴開始からCDDP投与終了までに1L以上の経口補水液を摂取<br>4. デカドロンを経口投与 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |

## Pembrolizumab(200)+CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌（非扁平上皮癌） | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量            | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |  |  |  |
| 1       | キイトルーダ<br>生食   | 200mg/body<br>100mL           | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| 3       | シスプラチン<br>生食   | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |
| [条件等]   |                |                               |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行（Pembrolizumab+PEM(500)/q3W）<br>2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |  |  |  |

### Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC5)+PEM(500)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | キイトルーダ<br>生食     | 200mg/body<br>100mL           | DIV<br>30min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食    | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5<br>250mL                 | DIV<br>1hr   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行 (Pembrolizumab+PEM(500)/q3W)<br>2. PEM投与に際して、葉酸(パンピタン連日)、ビタミンB12(シアノコバラミン注9週おき)の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC5-6)+nabPTX(100)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)    | 申請                           | 呼内           | 投与スケジュール                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|------------------------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                      |              | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | キイトルーダ<br>生食     | 200mg/body<br>100mL          | DIV<br>30min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | アブラキサン<br>生食     | 100mg/m <sup>2</sup><br>50mL | DIV<br>30min | ↓  |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    | ↓ |    |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6<br>250mL              | DIV<br>1hr   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                              |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行 (Pembrolizumab/q3W) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### Pembrolizumab(200)+CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)    | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | キイトルーダ<br>生食     | 200mg/body<br>100mL           | DIV<br>30min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行 (Pembrolizumab/q3W)<br>2. PTX投与に際し、レスタミン錠内服 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### Atezolizumab(1200)+BV(15)+CBDCA(AUC6)+PTX(200)/q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | テセントリク<br>生食     | 1200mg/body<br>250mL          | DIV<br>60min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr   | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 4       | ベパシズマブ<br>生食     | 15mg/kg<br>100mL              | DIV<br>90min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 4または6コース導入療法終了後、維持療法に移行 (Atezolizumab+BV/q3W)<br>2. PTX投与に際し、レスタミン錠内服 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### 3ヨト Atezolizumab(1200)+CDDP(75)+PEM(500) /q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | 申請                            | 呼内            | 投与スケジュール   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|----------------|-------------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量            | 投与方法/時間                       |               | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | テセントリク<br>生食   | 1200mg/body<br>250mL          | DIV<br>※60min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min  | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | シスプラチン<br>生食   | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |                |                               |               | 1. 4または6コース導入療法終了後、維持療法に移行(Atezolizumab+BV/q3W)<br>2. PEM投与に際して、葉酸(パンピタン連日)、ビタミンB12(シアノコバラミン注9週おき)の補充を行う<br>3. 点滴開始からCDDP投与終了までに1L以上の経口補水液を摂取<br>4. デカドロンを経口投与 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

### Atezolizumab(1200)+CDDP(75)+PEM(500) /q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量            | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | テセントリク<br>生食   | 1200mg/body<br>250mL          | DIV<br>60min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | シスプラチン<br>生食   | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |                |                               |              | 1. 4または6コース導入療法終了後、維持療法に移行(Atezolizumab+PEM/q3W)<br>2. PEM投与に際して、葉酸(パンピタン連日)、ビタミンB12(シアノコバラミン注9週おき)の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

### Atezolizumab(1200)+CBDCA(AUC6)+PEM(500) /q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | テセントリク<br>生食     | 1200mg/body<br>250mL          | DIV<br>60min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食    | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 4または6コース導入療法終了後、維持療法に移行(Atezolizumab+PEM/q3W)<br>2. PEM投与に際して、葉酸(パンピタン連日)、ビタミンB12(シアノコバラミン注9週おき)の補充を行う |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

### Atezolizumab(1200)+CBDCA(AUC6)+nabPTX(100) /q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                           | 呼内            | 投与スケジュール                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|------------------|------------------------------|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                      |               | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | テセントリク<br>生食     | 1200mg/body<br>250mL         | DIV<br>※60min | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | アブラキサン<br>生食     | 100mg/m <sup>2</sup><br>50mL | DIV<br>30min  | ↓  |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    | ↓ |    |  |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                | DIV<br>1hr    | ↓  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |                  |                              |               | 1. 4または6コース導入療法終了後、維持療法に移行(Atezolizumab/q3W) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

### Necitumumab(800)+CDDP(75)+GEM(1250) /q3W ±M

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)   | 申請                             | 呼内           | 投与スケジュール                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量             | 投与方法/時間                        |              | 1                                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | ボートラーザ<br>生食    | 800mg/body<br>250mL            | DIV<br>60min | ↓                                       |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | ゲムシタピン<br>5%Glu | 1250mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>30min | ↓                                       |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | シスプラチン<br>生食    | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL   | DIV<br>2hr   | ↓                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   |                 |                                |              | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行(Necitumumab/q3W) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |





- [条件等] 1. 1コース目、2コース目を行って、Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W療法に移行する。  
 2. オブジーボとヤーボイの投与間隔は30分以上あげる。  
 3. 薬剤調製時、生食を20mL除去後、薬液を注入。体重が37.5kg未満の場合は30mL除去する。

### (2回目)3週 Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+CDDP(75)+PEM(500)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌) | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|----------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量            | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | オブジーボ<br>生食    | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | シスプラチン<br>生食   | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                |                               |              | 1. 1コース目、2コース目を行って、Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W療法に移行する。<br>2. 2コース目は、ヤーボイなし |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### (1回目)Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | オブジーボ<br>生食      | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | ヤーボイ<br>生食       | 1mg/kg<br>100mL               | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | ペメトレキセド<br>生食    | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 4       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6<br>250mL               | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 1コース目、2コース目を行って、Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W療法に移行する。<br>2. オブジーボとヤーボイの投与間隔は30分以上あげる。<br>3. 薬剤調製時、生食を20mL除去後、薬液を注入。体重が37.5kg未満の場合は30mL除去する。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### (2回目)Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | オブジーボ<br>生食      | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食    | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6<br>250mL               | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 1コース目、2コース目を行って、Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W療法に移行する。<br>2. 2コース目は、ヤーボイなし |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

### (1回目)Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+CBDCA(AUC6)+PTX(200)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間                       |              | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1       | オブジーボ<br>生食      | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2       | ヤーボイ<br>生食       | 1mg/kg<br>100mL               | DIV<br>30min | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3       | パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 4       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr   | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]   |                  |                               |              | 1. 1コース目、2コース目を行って、Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W療法に移行する。<br>2. オブジーボとヤーボイの投与間隔は30分以上あげる。<br>3. 薬剤調製時、生食を20mL除去後、薬液を注入。体重が37.5kg未満の場合は30mL除去する。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

(2回目)Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)+CBDCA(AUC6)+PTX(200)

| 適応疾患               | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)                | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液            | 投与量                           | 投与方法/時間      |    | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 オブジーボ<br>生食      | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min |    | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2 ヤーボイ<br>生食       | 1mg/kg<br>100mL               | DIV<br>30min |    | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3 パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr   |    | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 4 カルボプラチン<br>5%Glu | AUC6<br>250mL                 | DIV<br>1hr   |    | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]              |                               |              |    | 1. 1コース目、2コース目を行って、Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W療法に移行する。<br>2. オブジーボとヤーボイの投与間隔は30分以上あける。<br>3. 薬剤調製時、生食を20mL除去後、薬液を注入。体重が37.5kg未満の場合は30mL除去する。 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

(術前補助)Nivolumab(360)+CBDCA(AUC5-6)+PTX(200)

| 適応疾患               | 非小細胞肺癌                        | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液            | 投与量                           | 投与方法/時間      |    | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 オブジーボ<br>生食      | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2 パクリタキセル<br>5%Glu | 200mg/m <sup>2</sup><br>500mL | DIV<br>3hr   |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3 カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6<br>250mL               | DIV<br>1hr   |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]              |                               |              |    | 1. 3コースまで |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

(術前補助)ショートNivolumab(360)+CDDP(75)+GEM(1000)/q3w

| 適応疾患              | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)                  | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液           | 投与量                            | 投与方法/時間      |    | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 オブジーボ<br>生食     | 360mg<br>100mL                 | DIV<br>30min |    | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2 ゲムシタピン<br>5%Glu | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>30min |    | ↓   |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3 シスプラチン<br>生食    | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL   | DIV<br>1hr   |    | ↓   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]             |                                |              |    | 1. 3コースまで<br>2. 点滴開始からCDDP投与終了までに1L以上の経口補水液を摂取<br>3. デカドロンを経口投与 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

(術前補助)Nivolumab(360)+CBDCA(AUC5-6)+GEM(1000)/q3w

| 適応疾患               | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)                  | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|--------------------|--------------------------------|--------------|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液            | 投与量                            | 投与方法/時間      |    | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 オブジーボ<br>生食      | 360mg<br>100mL                 | DIV<br>30min |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2 ゲムシタピン<br>5%Glu  | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>30min |    | ↓         |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3 カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6<br>250mL                | DIV<br>1hr   |    | ↓         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| [条件等]              |                                |              |    | 1. 3コースまで |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

(術前補助)ショートNivolumab(360)+CDDP(75)+PEM(500)/q3w

| 適応疾患            | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)                | 申請           | 呼内 | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
|-----------------|-------------------------------|--------------|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液         | 投与量                           | 投与方法/時間      |    | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 オブジーボ<br>生食   | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min |    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 2 ペムトレキセド<br>生食 | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min |    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |
| 3 シスプラチン<br>生食  | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   |    | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |

|       |  |
|-------|--|
| [条件等] | <ol style="list-style-type: none"> <li>3コースまで</li> <li>PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う</li> <li>点滴開始からCDDP投与終了までに1L以上の経口補水液を摂取</li> <li>デカドロンを経口投与</li> </ol> |
|-------|--|

(術前補助)Nivolumab(360)+CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)/q3w

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--|-------------------------------|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量  | 投与方法/時間                       |              | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | オプジーボ<br>生食  | 360mg<br>100mL                | DIV<br>30min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | カルボプラチン<br>5%Glu   | AUC5-6<br>250mL               | DIV<br>1hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   | <ol style="list-style-type: none"> <li>3コースまで</li> <li>PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う</li> </ol> |                               |              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

γ-ト Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) +CDDP (75)+PEM (500) /q3W(±M/q4W)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--|-------------------------------|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量  | 投与方法/時間                       |              | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | イジユド<br>生食   | 75mg<br>100mL                 | DIV<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | イミフィンジ<br>生食   | 1500mg(※)<br>100mL            | DIV<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 4       | シスプラチン<br>生食   | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL  | DIV<br>1hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4コース導入療法終了後、維持療法に移行</li> <li>※：イミフィンジは体重30kg以下の場合20mg/kg</li> <li>PEM投与に際して、葉酸、ビタミンB12の補充を行う</li> <li>点滴開始からCDDP終了までに1L以上の経口補水液を摂取</li> <li>デカドロンを経口投与</li> </ol> |                               |              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) +CBDCA(AUC5-6)+PEM(500)/q3W(±M/q4W)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)   | 申請                            | 呼内           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|--|-------------------------------|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量  | 投与方法/時間                       |              | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | イジユド<br>生食   | 75mg<br>100mL                 | DIV<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | イミフィンジ<br>生食   | 1500mg(※)<br>100mL            | DIV<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | ペメトレキセド<br>生食  | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>10min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 4       | カルボプラチン<br>5%Glu   | AUC5-6<br>250mL               | DIV<br>1hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| [条件等]   | <ol style="list-style-type: none"> <li>4コース導入療法終了後、維持療法に移行</li> <li>※：イミフィンジは体重30kg以下の場合20mg/kg</li> <li>PEM投与に際して、葉酸、ビタミンB12の補充を行う</li> </ol> |                               |              |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

γ-ト Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) +CDDP (75)+GEM (1000) /q3W(±M/q4W)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)   | 申請                             | 呼内           | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量             | 投与方法/時間                        |              | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | イジユド<br>生食      | 75mg<br>100mL                  | DIV<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | イミフィンジ<br>生食    | 1500mg(※)<br>100mL             | DIV<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | ゲムシタピン<br>5%Glu | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mL | DIV<br>30min | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 4       | シスプラチン<br>生食    | 75mg/m <sup>2</sup><br>250mL   | DIV<br>1hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| [条件等] | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行          |
|       | 2. ※：イミフィンジは体重30kg以下の場合20mg/kg  |
|       | 3. 点滴開始からCDDP終了までに1L以上の経口補水液を摂取 |
|       | 4. デカドロンを経口投与                   |

Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) +CBDCA(AUC5-6)+GEM (1000) /q3W(±M/q4W)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌)    | 申請                    | 呼内                    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間               |                       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | イジユド<br>生食       | 75mg                  | DIV<br>100mL<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | イミフィンジ<br>生食     | 1500mg(※)             | DIV<br>100mL<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | ゲムシタピン<br>5%Glu  | 1000mg/m <sup>2</sup> | DIV<br>100mL<br>30min | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 4       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6                | DIV<br>250mL<br>1hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| [条件等] | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行         |
|       | 2. ※：イミフィンジは体重30kg以下の場合20mg/kg |

Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) +CBDCA (AUC5-6)+nabPTX (100) /q3W(±M/q4W)

| 適応疾患    | 非小細胞肺癌           | 申請                   | 呼内                    | 投与スケジュール |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
|---------|------------------|----------------------|-----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量              | 投与方法/時間              |                       | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |  |
| 1       | イジユド<br>生食       | 75mg                 | DIV<br>100mL<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 2       | イミフィンジ<br>生食     | 1500mg(※)            | DIV<br>100mL<br>60min | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |
| 3       | アブラキサン<br>生食     | 100mg/m <sup>2</sup> | DIV<br>50mL<br>30min  | ↓        |   |   |   |   |   |   | ↓ |   |    |    |    |    |    |    | ↓ |    |  |
| 4       | カルボプラチン<br>5%Glu | AUC5-6               | DIV<br>250mL<br>1hr   | ↓        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |   |    |  |

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| [条件等] | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行         |
|       | 2. ※：イミフィンジは体重30kg以下の場合20mg/kg |