

非小細胞肺癌（維持療法）

PEM(500) / q3W

適応疾患	非小細胞肺癌	申請	呼内	投与スケジュール																
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
1	ペメトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	DIV 10min	↓																
[条件等]				1. 先行する ≥ 2 回の維持療法として投与 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う																

BV(15) / q3W

適応疾患	非小細胞肺癌	申請	呼内	投与スケジュール																
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
1	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	DIV 30min	↓																
[条件等]				1. 先行する ≥ 2 回の維持療法として投与																

PEM(500) + BV(15) / q3W

適応疾患	非小細胞肺癌	申請	呼内	投与スケジュール																
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
1	ペメトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	DIV 10min	↓																
2	ベバシズマブ 生食	15mg/kg 100mL	DIV 30min以上	↓																
[条件等]				1. 先行する ≥ 2 回の維持療法として投与 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う																

Durvalumab(1500) / q4W

適応疾患	非小細胞肺癌	申請	呼内	投与スケジュール																
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	~	28	
1	イミフィンジ 生食	1500mg(※) 100mL	DIV 60min以上	↓																
[条件等]				1. 先行する同時化学放射線療法後の地固め療法として投与 2. 投与期間は最大12か月まで。 3. 体重30kg以下では20mg/kg																

Pembrolizumab(200) + PEM(500) / q3W

適応疾患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	申請	呼内	投与スケジュール																
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
1	キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	DIV 30min	↓																
2	ペメトレキセド 生食	500mg/m ² 100mL	DIV 10min	↓																
[条件等]				1. 先行する ≥ 2 回の維持療法として投与 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う																

Pembrolizumab(200) / q3W

適応疾患	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	申請	呼内	投与スケジュール																
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
1	キイトルーダ 生食	200mg/body 100mL	DIV 30min	↓																
[条件等]				1. 先行する ≥ 2 回の維持療法として投与																

Atezolizumab(1200)+BV (15) /q3W

適応疾患			投与スケジュール																
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌申請 呼内)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間																	
1	テセントリク 生食 1200mg/body 250mL	DIV 60min	↓																
2	ベバシズマブ 生食 15mg/kg 100mL	DIV 30min	↓																
[条件等]			1. 先行するレジムの維持療法として投与																

Atezolizumab(1200)+PEM(500) /q3W

適応疾患			投与スケジュール																
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) 申請 呼内			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間																	
1	テセントリク 生食 1200mg/body 250mL	DIV ※60min	↓																
2	ペムトレキセド 生食 500mg/m ² 100mL	DIV 10min	↓																
[条件等]			1. 先行するレジムの維持療法として投与 2. PEM投与に際して、葉酸 (パンピタン連日)、ビタミンB12 (シアノコバラミン注9週おき) の補充を行う																

Atezolizumab(1200) /q3W

適応疾患			投与スケジュール																
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) 申請 呼内			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間																	
1	テセントリク 生食 1200mg/body 250mL	DIV 60min	↓																
[条件等]			1. 先行するレジムの維持療法として投与																

Necitumumab (800) /q3W

適応疾患			投与スケジュール																
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌) 申請 呼内			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間																	
1	ポートルーザ 生食 800mg/body 250mL	DIV 60min	↓						↓										
[条件等]			1. 先行するレジムの維持療法として投与																

Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) +PEM (500) /q4W [Maintenance]

適応疾患			投与スケジュール																
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌) 申請 呼内			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間																	
1	イジウド (維持2回目のみ) 生食 75mg 100mL	DIV 60min	↓																
2	イミフィンジ 生食 1500mg(※) 100mL	DIV 60min	↓																
3	ペムトレキセド 生食 500mg/m ² 100mL	DIV 10min	↓																
[条件等]			1. 先行するレジムの維持療法として投与 2. イジウドは維持療法2コース目のみ投与 3. ※: イミフィンジは体重30kg以下は20mg/kg 4. PEM投与に際して、葉酸、ビタミンB12の補充を行う																

Durvalumab (1500) +Tremelimumab (75) /q4W [Maintenance]

適応疾患			投与スケジュール																
非小細胞肺癌 申請 呼内			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間																	
1	イジウド (維持2回目のみ) 生食 75mg 100mL	DIV 60min	↓																
2	イミフィンジ 生食 1500mg(※) 100mL	DIV 60min	↓																
[条件等]			1. 先行するレジムの維持療法として投与 2. イジウドは維持療法2コース目のみ投与																

3. ※：イミフィンジは体重30kg以下は20mg/kg