

悪性胸膜中皮腫

CDDP(75) + PEM(500) / q3W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 | ペメトレキセド 500mg/m ² | DIV 生食 100mL 10min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シスプラチン 75mg/m ² | DIV 生食 250mL 2hr | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う 2. 4~6コースまで | | | | | | | | | | | | | | | | |

CDDP(75) + PEM(500) + BV(15) / q3W ±M

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 | ペメトレキセド 500mg/m ² | DIV 生食 100mL 10min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シスプラチン 75mg/m ² | DIV 生食 250mL 2hr | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ベバシズマブ 15mg/kg | DIV 生食 100mL 90min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. 6コース導入療法終了後、維持療法（PEM+BV）に移行 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う | | | | | | | | | | | | | | | | |

CBDCA(AUC5) + PEM(500) / q3W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|------------------------|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 | ペメトレキセド 500mg/m ² | DIV 生食 100mL 10min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | カルボプラチン AUC5 | DIV 5%Glu 250mL 1hr | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. 4~6コースまで 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う | | | | | | | | | | | | | | | | |

CBDCA(AUC5) + PEM(500) + BV(15) / q3W ±M

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 |
| 1 | ペメトレキセド 500mg/m ² | DIV 生食 100mL 10min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | カルボプラチン AUC5 | DIV 5%Glu 250mL 1hr | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ベバシズマブ 15mg/kg | DIV 生食 100mL 90min | | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. 6コース導入療法終了後、維持療法（PEM+BV）に移行 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う | | | | | | | | | | | | | | | | |

PEM(500)alone/q3W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 | | |
| 1 | ペムトレキセド | 500mg/m ² | DIV | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 100mL | 10min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VNR(30)alone/q3W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 | | |
| 1 | ロゼウス | 30mg/m ² | DIV | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 50mL | 全開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GEM(1000)/q4W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----------------------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 28 | | |
| 1 | ゲムシタピン | 1000mg/m ² | DIV | ↓ | | | | | | | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | |
| | 5%Glu | 100mL | 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivolumab(240)/q2W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1 | オブジーボ | 240mg/body | DIV | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 100mL | 30min以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivolumab(480)/q4W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 28 | | |
| 1 | オブジーボ | 480mg/body | DIV | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 100mL | 30min以上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ショット CDDP(75)+PEM(500)/q3W ±M

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ~ | 21 | | |
| 1 | ペムトレキセド | 500mg/m ² | DIV | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 100mL | 10min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | シスプラチン | 75mg/m ² | DIV | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 250mL | 1hr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. 4コース導入療法終了後、維持療法に移行 2. PEM投与に際して、葉酸（パンピタン連日）、ビタミンB12（シアノコバラミン注9週おき）の補充を行う 3. 点滴開始からCDDP投与終了までに1L以上の経口補水液を摂取 4. デカドロンを経口投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivolumab(360)+Ipilimumab(1)/q3W

| 適応疾患 | 悪性胸膜中皮腫 | 申請 | 呼内 | 投与スケジュール | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|--|--|
| 抗がん剤/輸液 | 投与量 | 投与方法/時間 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ~ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ~ | 42 | | |
| 1 | オブジーボ | 360mg/body | DIV | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 100mL | 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ヤーボイ | 1mg/kg | DIV | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生食 | 30mL | 30min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [条件等] | | | | 1. Nivolumabは3週ごと、Ipilimumabは6週ごとに投与 2. オータ間違い防止の観点から、臨床試験2コース分を1コースとしてレジメン登録 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |