

# 胃がん

## CDDP(60, d8)+TS-1(3W)/q5W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																		
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	21	~	35		
1	シスプラチン 生食 250mL	60mg/m <sup>2</sup>	DIV 2hr								↓											
2	TS-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80-120mg/day	PO 分2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	~	↓	↓		
[条件等]				1. 5~6コースまで																		

## PTX(80)alone/q4W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																		
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28		
1	パクリタキセル 5%Glu 250mL	80mg/m <sup>2</sup>	DIV 1hr	↓							↓							↓				
[条件等]				1. PTX投与に際し、レスタミン錠内服																		

## CPT-11(150)alone/q2W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																		
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
1	イリノテカン 生食 500mL	150mg/m <sup>2</sup>	DIV 90min	↓																		

## TS-1 alone

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																		
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	28	~	42		
1	TS-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80~120mg/day	PO 分2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
[条件等]				1. 28日間内服14日間休薬 2. 術後補助化学療法は8コース(1年間)																		

## TS-1(80) alone(alternate)

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																		
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~			
1	TS-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80mg/day	PO 分2	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓				

## SOX療法/q3W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																		
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21		
1	オキサリプラチン 5%Glu 250mL	100mg/m <sup>2</sup>	DIV 2hr	↓																		
2	TS-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80-120mg/day	PO 分2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
[条件等]				1. 術後補助療法の場合は、8コース(6か月まで)																		

## SP+Trastuzumab/q3W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																	
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
1	TS-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80-120mg/day	PO	分2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
2	ハーセプチン 生食	6mg(初回のみ8mg)/kg	DIV	60(初回90)min	↓																
3	シスプラチン 生食	60mg/m <sup>2</sup>	DIV	2hr	↓																

## Nivolumab(240)/q2W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																	
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	オブジーボ 生食	240mg/body	DIV	30min以上	↓																

## Nivolumab(480)/q4W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																	
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
1	オブジーボ 生食	480mg/body	DIV	30min以上	↓																

## RAM(8)+PTX(80)/q4W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																	
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
1	サイラムザ 生食	8mg/kg	DIV	1hr→30min	↓														↓		
2	パクリタキセル 生食	80mg/m <sup>2</sup>	DIV	1hr	↓						↓								↓		

## mFOLFOX6

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																	
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	レボホリナート 5%Glu	200mg/m <sup>2</sup>	DIV	2hr	↓																
2	オキサリプラチン 5%Glu	85mg/m <sup>2</sup>	DIV	2hr	↓																
3	フルオロウラシル 5%Glu	400mg/m <sup>2</sup>	DIV	全開	↓																
4	フルオロウラシル 生食	2400mg/m <sup>2</sup>	DIV	46hr	→	→															

[条件等] 1. TS-1等の薬剤との投与間隔に注意

## SOX+Trastuzumab/q3W

適応疾患	胃がん	申請	消外	投与スケジュール																	
抗がん剤/輸液	投与量	投与方法/時間		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
1	ハーセプチン 生食	6mg(初回のみ8mg)/kg	DIV	60(初回90)min	↓																
2	オキサリプラチン 5%Glu	100mg/m <sup>2</sup>	DIV	2hr	↓																
3	TS-1 (エスワンタイホウ配合OD錠)	80-120mg/day	PO	分2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

[条件等] 1. ハーセプチンは初回90分、2回目以降、副作用なければ60分で投与可。  
2. ハーセプチンはブドウ糖との配合禁忌のため、オキサリプラチンと同じ点滴ラインを用いないこと。