

## 質問票

<下記の質問に○印あるいはご記入下さい>

お子さんのお名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 歳 \_\_\_\_\_ カ月  
身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg

### 【夜間について】

夜尿（おねしょ）が生まれてからずっと続いている。 (いる/いない)

夜尿が6ヵ月以上なかった時期があったのに、再び始まった。

( \_\_\_\_\_ 歳に夜尿がなくなったが、 \_\_\_\_\_ 歳に夜尿が再び始まった)

夜尿の頻度は、 (毎晩/ \_\_\_\_\_ 日/週)

一晩の夜尿回数は、 (1回/複数回)

季節による夜尿の変化は、 (ない/夏に少ない)

外泊中も夜尿がある。 (ある/ない)

### 【昼間について】

昼寝の時以外に昼間尿失禁（おもらし）がある。 (ない/ある \_\_\_\_\_ 回/週)

(生まれてからずっと/おむつが取れて再び始まった)

急におしっこがしたくなってトイレにかけこむことがある。 (ない/ある)

もじもじしながら、尿意を我慢するしぐさ（次ページ：図1）がある。 (ない/ある)

週に1回以上、授業中にトイレに行きたくなる。 (ない/ある)

おしっこは、いきおいよく放物線を描いて出る。 (はい/いいえ)

おしっこは、最後まで途切れないで出る。 (はい/いいえ)

お腹に力をいれたり、お腹を押したりしないとおしっこが出にくい。 (はい/いいえ)

昼間の排尿回数は、 ( \_\_\_\_\_ 回/日)

### 【排便について】

便をもらすことがある。 (ない/ある \_\_\_\_\_ 回/週)

便の出る頻度は、 (毎日/ \_\_\_\_\_ 回/週)


便の硬さ（次のページ：図2）は、 (バナナ状/べっとり/コロコロ：type \_\_\_\_\_)

流した後に、便器の壁に便がつく。 (はい/いいえ)

毎朝、排便がある。 (はい/いいえ)

排便に10分以上かかる。 (はい/いいえ)

【図 1】



*C. Persson de Geeter, et al. Urologe 2004. 43; 807-812.*

【図 2】



**Type 1** ⇒コロコロした便。ナッツのような便。



**Type 2** ⇒コロコロした便が連なっている。ソーセージのような便。



**Type 3** ⇒ソーセージのような便で、表面に割れ目が見られる。



**Type 4** ⇒ソーセージのような便で、表面はなめらかで柔らかい。



**Type 5** ⇒柔らかな、ドロっとしたかたまり。辺縁はシャープ。



**Type 6** ⇒おかゆのように柔らかな便。



**Type 7** ⇒液体状の便。便のかたまりが見られない。

【夜尿の対応】

寝る前にきちんと排尿させている。 (いる/いない)  
寝る前に水分制限をしている。 (いる/いない)  
夜中、起こしている。 (いる/いない)  
夜尿をしたときに、叱っている。 (いる/いない)  
夜尿の始末は、 (親がする/本人がする/一緒にする)

【夜尿症の治療歴】

これまでに夜尿症の治療を受けたことがある。 (ない/ある: ○をつけて下さい)

生活指導 水分制限、塩分制限、排尿訓練、他: \_\_\_\_\_

薬物投与 ミニリンメルト (120、240)・デスマプレシンスプレー  
バップフォー・ウリトス・ベシケア・ステープラ・ネオキシテープ  
トフラニール・トリプタノール・アナフラニール  
その他 (\_\_\_\_\_)

夜尿アラーム ピスコール・ウェットストップ・チッチコール

【妊娠・出産時について】

妊娠中の異常 (ない/ある \_\_\_\_\_)

出産時 (在胎 \_\_\_\_\_ 週 \_\_\_\_\_ 日、 \_\_\_\_\_ g、正常分娩/帝王切開)

出産時の異常 (ない/黄疸あり/仮死あり/その他 \_\_\_\_\_)

出産前から生後1ヵ月までに医師に何か言われたことがある。

(ない/ある \_\_\_\_\_)

【発達・発育について】

体格について遅れを言われたことがある。 (ある/ない)

発達について遅れを言われたことがある。 (ある/ない)

頸のすわり ( \_\_\_\_\_ ヵ月)、おすわり ( \_\_\_\_\_ ヵ月)、ひとり歩き ( \_\_\_\_\_ ヵ月)

2語以上の発語が ( \_\_\_\_\_ 歳 \_\_\_\_\_ ヵ月)

【これまでにかかった病気について】

\* 「ある」に○の場合は詳しく（いつから／治療について）記載下さい。

- ・注意欠陥多動症 (ADHD) (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・自閉症 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・てんかん：けいれん (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・二分脊椎 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・神経因性膀胱 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・尿路感染症：膀胱炎 腎盂腎炎 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・膀胱尿管逆流症 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・水腎症 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・糖尿病 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・緑内障 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・心臓病：先天性心疾患 不整脈 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・睡眠時無呼吸症候群 (ない／ある \_\_\_\_\_)
- ・その他の病気 (ない／ある \_\_\_\_\_)

【家族について】

- 6歳を過ぎても夜尿があった 父 (なし／あり) 母 (なし／あり) 兄弟 (なし／あり)
- 高血圧・腎臓病 ( )
- 神経疾患 ( )
- その他の病気 ( )
- 現在の家族構成 ( )
- これまでの家族構成の変化 ( )
- 自宅の転居 ( )
- 父：職業 \_\_\_\_\_、性格 \_\_\_\_\_
- 母：職業 \_\_\_\_\_、性格 \_\_\_\_\_

【睡眠の状況】

睡眠時間 ( \_\_\_\_\_ 時に就寝、 \_\_\_\_\_ 時に起床、合計 \_\_\_\_\_ 時間)  
同じ部屋で一緒に寝ている方 (一人/父/母/兄弟)  
いびき (ない/ある)  
ねつき (よい/悪い)  
途中でよく起きる (起きない/起きる)  
寝言 (ない/ある)  
歯ぎしり (ない/ある)  
寝相 (良い/悪い)  
寝起き (良い/悪い)

【生活環境について】

本人の性格 ( \_\_\_\_\_ )  
幼稚園・学校の状況 (よろこんで行く/嫌がる)  
これまでに精神的ショックを受けたことがある。(ない/ある \_\_\_\_\_ )  
夕食終了の時間 ( \_\_\_\_\_ 時 \_\_\_\_\_ 分頃)

【食事の好み】

甘いもの (多い/普通/少ない)  
しょっぱいもの (多い/普通/少ない)  
牛乳 ( \_\_\_\_\_ ml/日)  
水分摂取量 (多い/普通/少ない)

学校以外の塾・習い事 ( \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ 時～ \_\_\_\_\_ 時、 \_\_\_\_\_ 回/週)  
( \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ 時～ \_\_\_\_\_ 時、 \_\_\_\_\_ 回/週)  
( \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ 時～ \_\_\_\_\_ 時、 \_\_\_\_\_ 回/週)