

# 緩和ケアチームニュース

鎮痛補助薬の第一選択として期待の新薬「タリージェ®錠」

## 適応は「末梢性神経障害性疼痛」

リリカ®OD錠と同系統（カルシウムチャネル阻害薬）の薬剤です。

「末梢性神経障害性疼痛」に適応がある数少ない薬剤であり、効果と副作用のバランスが良いと期待される新薬です。

## どんな良いところがあるの？

- 利点① 比較的**眠気やめまいが少ない**
  - ✓ 初期に10%程度の患者さんに生じる可能性がありますが、日常生活への支障が少ない程度（軽度～中等度）がほとんどです。
- 利点② **薬物相互作用が少ない**
  - ✓ 主に腎排泄、一部は肝臓でグルクロン酸抱合により代謝されます。よって他の薬剤との飲み合わせの心配が少ないです。



2.5 mg



5 mg



10 mg



15 mg

## 注意するところはどんな点？

- 注意点① **3-7日程度の間隔をあけて（症状に応じて）徐々に増量**



- 注意点② **腎機能が低下している患者さんには少なめから開始**
  - ✓ 腎機能が低下している場合は、以下を目安に減量することが推奨されています

|       |      | 腎機能障害の程度（CLcr：mL/min） |              |              |
|-------|------|-----------------------|--------------|--------------|
|       |      | 90>CLcr≥60            | 60>CLcr≥30   | 30>CLcr      |
| 1日投与量 |      | 10～30mg               | 5～15mg       | 2.5～7.5mg    |
| 初期用量  |      | 1回5mg 1日2回            | 1回2.5mg 1日2回 | 1回2.5mg 1日1回 |
| 有効用量  | 最低用量 | 1回10mg 1日2回           | 1回5mg 1日2回   | 1回5mg 1日1回   |
|       | 推奨用量 | 1回15mg 1日2回           | 1回7.5mg 1日2回 | 1回7.5mg 1日1回 |

## その他

- **簡易懸濁可能**です。割線に沿って**割って飲む**※こともできます。

※失活しやすいため、内服直前に割ってください。

また安定性を考慮し、薬剤部での分包・分割・一包化は行いません。予めご了承ください。