



※ ترامadol・コデインから他剤に切り替える際は、
換算表より低用量で切り替え
 することをお勧めします。
 (一部患者で効果が減弱している可能性あり)



オキシコドン注 10mL (100mg)
 ≡ ナルベイン注 5mL (10mg)
 = ナルベイン注 1mL (高濃度)

ナルベイン注
 1mL 2mg (0.2%)
 2mL 20mg (1%)

NAV0.2% : オキシコドン注 : フェンタニル
1 ml ≡ 2ml ≡ 8ml

ナルベイン注 指示

①ナルサス® 2mg/日相当
≒オキシコドン徐放錠6.6mg相当

生理食塩水 8ml
0.2%ナルベイン® 2ml

計10ml

0.05ml/h

例：レスキュー0.5ml≒ナルラピド® 0.8mg

③ナルサス® 5mg/日相当
≒オキシコドン徐放錠15mg相当

生理食塩水 5ml
0.2 %ナルベイン® 5ml

計10ml

0.05ml/h

例：レスキュー0.3ml=ナルラピド®1.2mg

②ナルサス® 3mg/日相当
≒オキシコドン徐放錠10mg相当

生理食塩水 7ml
0.2 %ナルベイン 3ml

計10ml

0.05ml/h

例：レスキュー0.4ml≒ナルラピド® 1mg

ナルサス® 38mg/日相当
≒オキシコドン徐放錠130mg相当

①0.2%ナルベイン® 10ml 原液
0.2ml/h (例：レスキュー0.2ml≒ナルラピド® 1.6mg)

②1% ナルベイン®2ml+生理食塩水8ml
0.2ml/h (例：レスキュー0.2ml≒ナルラピド® 1.6mg)