緩和ケアチームニュー

先生!その患者さん、イーフェンで家に帰れるかも

こんなことで困っていませんか?

- ・レスキュー薬よ・・・もっと速く効いてくれ!
- せっかくフェンタニル貼付剤にしたのにレスキュー薬が経口、坐薬しかない・・・
- あとは便秘だけなのに・・・

このような場合、イーフェンバッカル錠を導入するとうまくいくかもしれません。

イーフェンの特徴とは

イーフェンはフェンタニルロ腔粘膜 吸収剤です。口腔粘膜から吸収される ため、従来のレスキュー薬に比べより 速く効きます。また、嚥下ができな い、消化管が使いにくい患者さんに も使いやすいです。便秘が少ないのも 特徴です。

■イーフェンバッカル錠と従来のレスキュー薬との比較

	イーフェン	オプソ・オキノーム
効果発現時間	約 10~15 分	約 20~30 分
効果持続時間	約 2 時間	3~6 時間
使用方法	複雑	簡便
便秘	•	<

良いこと尽くしと思いきやちょっと注意点 ■イーフェンの開始量

- ・定期オピオイド量によって開始量が決まってます。
- ・ 至適投与量に個人差があります
- 1 日 4 回の突出痛にしか使えません (それぞれ 1 回だけ追加ができます)
- 1 度使用したら4時間以上間隔を開ける必要が あります(追加分は含みません)
- ・患者または介護者の理解力が必要です
- イーフェンが使えない時のレスキュー薬の処方が必要です

緩和ケアチームはどうやってるの?

-緩和ケアチームで使用している指示-

- イーフェン使用後30分で評価
- 鎮痛不十分ならイーフェン使用後 30 分 ~ 2 時間後まで 1 回のみ追加
- ・イーフェン使用後、4時間経過後は、イーフェン追加可
- イーフェンは 1 日 4 回まで (追加投与は含まない)
- ・ 鎮痛不十分なら、従来のレスキュー薬使用



イーフェン 開始量	50 µg	100 µg
経口モルヒネ	30~ 60mg	60mg以上
オキシコンチン	20~ 40mg	40mg以上
デュロテップ MT パッチ	2.1~ 4.2mg	4.2mg 以上
フェントス	1~2mg	2mg 以上



共适 責文