

【11】泌尿器科

レジメン名称:腎細胞癌(有転移症例・手術不能例に対する免疫療法Ⅰ)

診療科名	泌尿器科	整理番号														泌尿	—	1		
適応	腎細胞癌																		投与スケジュール(日)	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～			
スミフェロン	300～600万	IM(自己)	3回／週							3回／週							～			

レジメン名称:腎細胞癌(有転移症例・手術不能例に対する免疫療法Ⅱ)

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	2
適応	腎細胞癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～		
イムナクス	300～600万	IM(自己)	3回／週							3回／週							～		

レジメン名称:腎細胞癌(有転移症例・手術不能例に対する免疫療法 20091110-25)

診療科名	泌尿器科	整理番号														泌尿	3		
適応	腎細胞癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～		
イムネース	70～210万	IVDI	1～7回/週							1～7回/週							～		

レジメン名称:腎細胞癌(術後補助免疫療法)

20091110-14

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	4	
適応	腎細胞癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～			
①スミフェロン	300～600万	IM(自己)	3回／週							3回／週							～			
②OIF	500万	IM(自己)	3回／週							回／週							～			

※週3回、隔日に投与する。

①、②のいずれかを選択。

レジメン名称:MVAC療法

20111207-10

20100804-7(保留)

診療科名	泌尿器科																			整理番号	泌尿		—	5
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	～	14	15	16	～	21	22	23	～	28					
メトレキセート	30mg/m2	IVDI	↓									↓				↓								
エクザール	3mg/m2	IV		↓								↓				↓								
アドリアシン	30mg/m2	IV		↓																				
プリプラチン	70mg/m2	IVDI		↓																				

※尿路上皮癌有転移症例(M1)・再発ハイリスク症例(pT3・4NXMO、pTXN+MO)

レジメン名称:TIP療法

診療科名	泌尿器科																整理番号	泌尿		—	6
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～				
パクリタキセル	200mg/m2	IVDI	↓																		
イホマイト	1500mg/m2	IVDI	↓	↓	↓																
フリプラチン	70mg/m2	IVDI	↓																		

※尿路上皮癌有転移症例(M1)・再発ハイリスク症例(pT3・4NXMO、pTXN+MO)

20111207-05

レジメン名称:局所浸潤に対する化学療法 I

20100804-2 保留

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 - 7																
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
メトレキサート	30mg/m2	IVDI	↓																
フリプラチン	70mg/m2	IA		↓															

※Radiation 40～60 Gy

※2コース

20111207-04

レジメン名称:局所浸潤に対する化学療法(化学放射線療法)II

20091110-5

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	8
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ブリプラチン	10-20mg/body	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												

※Radiation 60～70 Gy

※2コース

レジメン名称:表在性腫瘍再発予防治療 I

20091110-26

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	9
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	—	8	—	15	—	22	—	29	—	36	—	43	—	50		
①テラルピシン	20-40mg/body	膀胱内注入	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		
②マイトマイシン	20-40mg/body	膀胱内注入	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		

※テラルピシンは8回、マイトマイシンは8～12回継続する。2週毎の投与とすることもある。

①、②のいずれかを選択。

レジメン名称:表在性腫瘍再発予防治療Ⅱ

泌尿-9に統合?

診療科名	泌尿器科		整理番号												泌尿	10			
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	—	15	—	29	—	43	—	57	—	71	—	85	—	99	～	
マイトマイシン	10mg/body	膀胱内注入	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		

※2週間毎、3～6ヶ月、膀胱内注入

レジメン名称:表在性腫瘍再発予防治療Ⅲ

20091110-2

診療科名	泌尿器科												整理番号	泌尿	—	11			
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	—	8	—	15	—	22	—	29	—	36						
①イムシト	80mg/body	膀胱内注入	↓		↓		↓		↓		↓		↓						
②イムノプラダー	40-80mf/body	膀胱内注入	↓		↓		↓		↓		↓		↓						

※毎週、6回、膀胱内注入

①、②のいずれかを選択。

First line 内分泌療法

- (1)※下記、First line 内分泌療法Ⅰのうち、①、②、③のいずれか単剤を選択。
- (2)※下記、First line 内分泌療法Ⅱのうち、④、⑤、⑥のいずれか単剤を選択。
- (3)※下記、First line 内分泌療法Ⅰ、Ⅱから、各1剤ずつを選択し、併用。

レジメン名称:First line 内分泌療法Ⅰ

20091110-15

20170802-02

							整理番号		泌尿 ー 12								
診療科名	泌尿器科																
適応	前立腺癌		投与スケジュール(日)														
薬剤名	投与量	投与方法		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		1ヶ月		~	
①ゾラデックス	3.6mg/body	SC	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		
②ゾラデックスLA	11.25mg/body	SC	↓				↓				↓				↓		
③リュープリン	3.75mg/body	SC	↓		↓		↓		↓		↓		↓		↓		
④リュープリンSR	11.25mg/body	SC	↓				↓								↓		
⑤リュープリンPRO	22.5mg/body	SC	↓												↓		

※①、③(1ヶ月毎)または②、④(3ヶ月毎)または⑤(6ヶ月毎)を選択。

※①～⑤の一つに下記First line 内分泌療法Ⅱのいずれか一つを組み合わせ使用することもある。

レジメン名称:First line 内分泌療法Ⅱ

20091110-1

診療科名	泌尿器科		整理番号											泌尿		—		13	
適応	前立腺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～		
④オダイン	375mg/body	PO																	
⑤カソデックス	80mg/body	PO																	
⑥フロスタール	100mg/body	SC																	

※④、⑤、⑥のいずれかを選択。

※④～⑥の一つに上記の①～③のうちのいずれか一つを組み合わせて使用することもある。

※オダインは朝昼夕食後の3回に分けて、

カソデックスは朝食後1回、フロスタールは朝夕食後2回に分けて内服

レジメン名称:Second line 内分泌療法Ⅰ

20091110-10

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	14
適応	前立腺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～		
フロセキソール	1.5～3mg/body	PO																	
エストラサイト	626.8mg/body	PO																	

レジメン名称:内分泌療法後再燃例

20091110-7

診療科名	泌尿器科										整理番号		泌尿		—		15			
適応	前立腺癌										投与スケジュール(日)									
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～			
デカドロン	1～2mg/body	PO																		

※毎週、6回、抗がん剤を含まないため登録を要さない。

レジメン名称:BEP療法

20111207-02

20091110-3

診療科名	泌尿器科																			整理番号	泌尿	—	16
適応	精巣腫瘍		投与スケジュール(日)																				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21				
ブレオ	30mg/body	IM	↓							↓								↓					
ラステット	100mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓																
プリプラチン	20mg/m2/body	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓																

※3週間毎に4コース実施する。

※Good risk群、First line化学療法

レジメン名称:VIP/VB療法

診療科名	泌尿器科		整理番号										泌尿	—	17					
適応	精巣腫瘍		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ラステット	75mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓													
イホマイト	1200mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓													
プリプラチン	20mg/m2/body	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓													
エクザール	0.18mg/kg	IV	↓																	
フレオ	30mg/body	IM	↓							↓								↓		

※3週間毎に2～4コース実施する。

※Poor risk群、First line化学療法

レジメン名称:TIP療法

20111207-11

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 — 18																	
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
パクリタセル	215-250mg/m ²	IVDI/3hr		↓																
イホマイト	1200mg/m ²	IVDI/2hr			↓	↓	↓	↓	↓											
プリプラチン	20mg/m ²	IVDI/1hr			↓	↓	↓	↓	↓											

レジメン名称:T-BEP療法

診療科名	泌尿器科		整理番号										泌尿	—	19				
適応	精巣腫瘍		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	～	15	16	17	～	21	
パクリタセル	175mg/m2	IVDI	↓																
フレオ	30mg/body	IM		↓							↓				↓				
ラステット	120mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												
プリプラチン	20mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												

※3週間毎に4コース実施する。

※Salvage化学療法②

※TXLは175→215→250mg/m²にdose escalationする。

レジメン名称: High-dose chemotherapy

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 — 20																
適応	精巣腫瘍		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	～	28	…	35					
パラプラチン	AUC=18 /course	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												
ラステット	1200mg/m2/ course	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												
イホマイト [®] (PBSCT)	6000mg/m2/ course	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												
									↓										

※4～6週間毎に2コース実施する。

※Salvage化学療法③

※CBDCA投与量(mg/body/course)=AUC*(Ccr*BSA/1.48+25)

20111207-09削除

20100804-5

レジメン名称: GC療法

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	21
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI	↓							↓								↓				
フリプラチン	70mg/m2	IVDI		↓																		

※4週間毎に10コース実施する。

※尿路上皮癌有転移症例(M1)、再発ハイリスク症例(PT3.4N×MO.PT×N+MO)

20111207-06

20100804-3

レジメン名称: 内分泌療法後再燃に対する化学療法

診療科名	泌尿器科		整理番号													泌尿	—	22		
適応	前立腺癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
タキソール	75mg/m2	IVDI/1hr	↓																	

※3週間毎に8コース実施する。

20111207-07

20091110-13

レジメン名称: EP療法

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 — 23																
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ラステット	100mg/m2	IVDI/2hr	↓	↓	↓	↓	↓												
フリプラチン	20mg/m2	IVDI/1hr	↓	↓	↓	↓	↓												

※3週間毎に4コース実施する。

20111207-03

20100804-1

レジメン名称: 精上皮腫術後化学療法

診療科名	泌尿器科	整理番号																		泌尿	—	24
適応	精上皮腫	投与スケジュール(日)																				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
ハラプラチン	AUC=7	IVDI	↓																			

※再発リスクの高い精上皮腫、PT2～4NOMO。

※3週間毎に2コース実施する。

20091110-22

レジメン名称: 経尿道的膀胱腫瘍切除後注入療法

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿		—		25	
適応	膀胱腫瘍		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～					
①テラルピシン	20-40mg/body	膀胱内注入	↓																			
②マイトマイシンC	20-40mg/body	膀胱内注入	↓																			

※経尿道的膀胱腫瘍切除後、6時間以内に注入。

①、②のいずれかを選択。

20111207-08

20100804-4

レジメン名称: GC療法(3週スケジュール)

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	26	
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓										
フリプラチン	70mg/m2	IVDI/1hr	↓																	

※3週間毎に10コース実施する。

20111207-14

20100804-6

レジメン名称: GEMOX

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	27
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI	↓							↓												
エルプラット	85mg/m2	IVDI	↓																			

※3週間毎に4コース実施する。

※エルプラットは最大130mg/m²の投与を行うことがある。

20111207-13

20100203-01

レジメン名称:Pca療法

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	28
適応	尿路上皮癌(膀胱癌)		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
パクリタキセル	175mg/m2	IVDI/3hr	↓																			
ハラプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																			

※3週間毎に10コース実施する。

レジメン名称:ネクサバル療法

20091110-18

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—		29
適応	腎細胞がん		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～			
ネクサバル	800mg/body	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			

※朝夕食後の2回に分けて投与する。

レジメン名称:スーテント療法

20091110-19

診療科名	泌尿器科		整理番号												泌尿	—	30			
適応	腎細胞がん		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	28	29	～	42	
スーテント	50mg/body	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				

※朝食後1回経口投与する。

※4週投与し2週休薬する。

20111207-12

20091110-20

レジメン名称:TIN療法

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	31
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
パクリタキセル	215mg/m2	IVDI/3hr		↓																		
イホマト	1200mg/m2	IVDI/2hr			↓	↓	↓	↓	↓													
アクブラ	100mg/m2	IVDI/2hr			↓																	

※3週間毎に実施する。

レジメン名称:UFT療法

20091110-23

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	32
適応	膀胱癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～		
UFT	300-600mg/body	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		

※放射線と併用することがある。

レジメン名称:VIP療法

20111207-01

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 ー 33																
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ラステット	75mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												
イホマト	1200mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												
プリプラチン	20mg/m2	IVDI	↓	↓	↓	↓	↓												

※3週間毎に4コース実施する。

20111207-15

20110209-1

レジメン名称: DocOX

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	34
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
トセタキセル	75mg/m2	IVDI/1hr	↓																			
エルフラット	80mg/m2	IVDI/2hr	↓																			

※3週間毎に実施する。

20111207-16

20110209-2

レジメン名称: PIN療法

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	35
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
パクリタキセル	175mg/m2	IVDI/3hr	↓																			
イホマイト	1500mg/m2	IVDI/1hr	↓	↓	↓																	
アクブラ	70mg/m2	IVDI/30min	↓																			

※4週間毎に実施する。

20111207-17

レジメン名称: BE-CBDCA療法

診療科名		泌尿器科	整理番号														泌尿	—	36			
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
ブレオ	30mg/body	IM	↓							↓							↓					
ラステット	100mg/m2	IVDI/2hr	↓	↓	↓	↓	↓															
ハラプラチン	AUC=5	IVDI/2hr	↓																			

20111207-30

レジメン名称: GEP療法

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	37
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
ゲムシタビン	800mg/m2	IVDI/30min	↓							↓							↓					
ラステット	60mg/m2	IVDI/2hr	↓	↓	↓																	
フリプラチン	20mg/m2	IVDI/45min	↓	↓	↓																	

20120404-01

レジメン名称: トーリセル療法

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	38
適応	腎がん		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
トーリセル	25mg/body	IVDI/1hr	↓																

※トーリセルは、添付溶解液1.8mLで溶解(10mg/mL)

レジメン名称:局所浸潤に対する化学療法(化学放射線療法)Ⅲ (GEM少量)療法 20121107-03

診療科名	泌尿器科		整理番号										泌尿	—	39		
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)														
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7								
ゲムシタビン	100mg/m2	IVDI/1hr	↓														

※放射線併用において通常4週、最大6週使用(祝祭日対策のためレジメンオーダーは7週可)

レジメン名称:浸潤性膀胱癌動注(CDDP+DOX)療法

20121107-04

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 — 40																	
適応	膀胱癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
プリプラチン	70mg/m2	IA	↓																	
ドキソルビン	70mg/m2	IA	↓																	

※3コース

レジメン名称:First line 内分泌療法Ⅲ(ゴナックス療法)

20130206-01

診療科名	泌尿器科		整理番号																泌尿	—	41
適応	前立腺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28		
ゴナックス	初回 120mg×2 2回目以降 80mg×1	SC (腹部)	↓																		

※初回は2カ所に分けて腹部皮下投与、2回目以降は1カ所に腹部皮下投与

※調製後1時間以内に使用

※初回は1Vあたり3mLの注射用水、2回目以降は1Vあたり4.2mLの注射用水で調製する。

レジメン名称:GDC療法

20130904-01

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 — 42																
適応	前立腺癌／膀胱癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ゲムシタビン	800-1000mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓									
ドセタキセル	75-80mg/m ²	IVDI/1hr	↓																
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																

※6コース

レジメン名称:Gemcitabine膀胱注入療法

20131204-07

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	43
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
ゲムシタビン	2g/m2	膀胱内注入	↓																

レジメン名称:陰茎癌TIP療法

20140108-06

診療科名	泌尿器科		整理番号 泌尿 ー 44																
適応	陰茎癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～	～	21
ハクリタキセル	175mg/m2	IVDI	↓																
イホマイト	1200mg/m2	IVDI	↓	↓	↓														
フリフラチン	25mg/m2	IVDI	↓	↓	↓														

※尿路上皮癌有転移症例(M1)・再発ハイリスク症例(pT3・4NXMO、pTXN+MO)

レジメン名称:カバジタキセル 療法

20150513-01

診療科名	泌尿器科																整理番号	泌尿		—		45	
適応	前立腺癌		投与スケジュール(日)																				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～	～	21				
ジェブタ	25mg/m2	IVDI/1hr	↓																				

※基本的にLH-RH製剤と併用

レジメン名称: CBDCA (AUC=4.5)+GEM療法

20160601-01

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—		46
適応	尿路上皮がん		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ケムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓										
カルボプラチン	AUC=4.5	IVDI/1hr	↓																	

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:【3週】Pembrolizumab 療法

20180905-03

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	48
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
キイトルダ [®]	200mg/body	IVDI/30min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:【6週】Pembrolizumab 療法

20180905-03

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	48
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	42			
キイトルダ [®]	400mg/body	IVDI/30min	↓																			

※6週毎に繰り返す。

レジメン名称: Nivolumab (240mg/body) 療法

20180905-04

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	49
適応	腎癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オフゾーホ	240mg/body	IVDI/30min	↓																

※2週毎に繰り返す。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

110

レジメン名称:パドセブ療法

20211201-01

診療科名	泌尿器科	整理番号																	泌尿	—	56
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28		
パドセブ	1.25mg/kg (最大125mg)	IVDI/30min	↓							↓								↓			

※1段階減量:1.0mg/kg(最大100mg)

※2段階減量:0.75mg/kg(最大75mg)

※3段階減量:0.5mg/kg(最大50mg)

※15.5mg未満の場合、生食10mL抜き取り

レジメン名称:【3週】Pembrolizumab(TMB-High) 療法

20220406-01

診療科名	消化器内科		整理番号																	泌尿	—	57
適応	TMB-Hを有する固形癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
キイトルーダ [®]	200mg/body	IVDI/30min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:【6週】Pembrolizumab(TMB-High) 療法

20220406-01

診療科名	消化器内科		整理番号																	泌尿	—	57
適応	TMB-Hを有する固形癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	42			
キイトルーダ [®]	400mg/body	IVDI/30min	↓																			

※6週毎に繰り返す。

レジメン名称:Pembrolizumab+レンバチニブ療法

20220406-02

診療科名	婦人科																	整理番号	泌尿			—		58
適応	進行・再発の子宮体癌		投与スケジュール(日)																					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21					
キイトルーダ [®]	200mg/body	IVDI/30min	↓																					

※レンバチニブは別途処方

レジメン名称:Nivolumab(240mg/body) 療法

20220406-03

診療科名	泌尿器科		整理番号														泌尿	—	59
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オプジーボ	240mg/body	IVDI/30min	↓																

※2週毎に繰り返す。

※投与期間は1年間

レジメン名称:Nivolumab(480mg/body) 療法

20220406-03

診療科名	泌尿器科		整理番号																	泌尿	—	59
適応	尿路上皮癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
オプジーボ	480mg/body	IVDI/30min	↓																			

※4週毎に繰り返す。

※投与期間は1年間

レジメン名称:Pembrolizumab(腎癌術後補助)療法(3週/6週)

20221207-01

診療科名	泌尿器科		整理番号										泌尿		ー		60			
適応	腎摘除術又は腎部分切除術後の再発リスクが高い透明細胞型腎細胞癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
キイトルーダ [®]	200mg/body	IVDI/30min	↓																	

※6週ごと投与の場合は、1サイクル42日

※3週投与の場合は17回まで、6週投与の場合は8回まで投与可

レジメン名称:TGP療法

20231004-03

診療科名	泌尿器科																				整理番号	泌尿	ー	61
適応	胚細胞腫瘍		投与スケジュール(日)																					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21					
パクリタセル	80mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓														
ゲムシタビン	800mg/m2	IVDI/30min	↓							↓														
シスプラチン	50mg/m2	IVDI/2hr	↓							↓														

※2nd line以降で使用

※PDまで