

【3】呼吸器内科

レジメン名称: Doc60+Cb6-q4W療法

20110706-03

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	1
適応	非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21
ドセタキセル	60mg/m2	IVDI/1hr	↓														
カルボフラン	AUC=6	IVDI/1hr	↓														

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: Doc40+Cb3-q2W療法

20110706-02

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	2
適応	非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ドセタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr	↓														
カルボフラン	AUC=3	IVDI/1hr	↓														

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+DOC+RT療法

20110706-05

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	3
適応	非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ドセタキセル	30mg/m2	IVDI/1hr	↓														
カルボフラン	AUC=3	IVDI/1hr	↓														

※抗がん剤と放射線60Gyの同時併用療法

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: Doc60+CDDP80-q4W療法

20110706-02

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	4
適応	非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 28
ドセタキセル	60mg/m2	IVDI/1hr	↓														
シスフラン	80mg/m2	IVDI/1hr	↓														

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP+DOC+RT療法

20110706-04

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	5
適応	非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ドセタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr	↓														
シスフラン	40mg/m2	IVDI/1hr	↓														

※2週毎に8コース繰り返す。

レジメン名称: CBDCA + PTX 療法

20110831-19

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	6
適応	非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21

パクリタキセル	200mg/m2	IVDI/3hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■
カルボフラン	AUC=6	IVDI/1hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: Pacli120+Cb3-q2W療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	7														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
パクリタキセル	120mg/m2	IVDI/3hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
カルボフラン	AUC=3	IVDI/1hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP+TS-1 21days療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	8														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	～	21	～	28	…	35
TS-1	40–60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓
シスフラン	60mg/m2	IVDI/1hr		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	↓	■	■	■	■

※4～5週毎に繰り返す。

TS-1は、21日間投与後14日間休薬。ただし、次コース開始基準を満たせば休薬を7日間に短縮可能。

レジメン名称: CDDP+TS-1+RT療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	9														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
TS-1	40–60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓
シスフラン	60mg/m2	IVDI/1hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※4週毎に繰り返す。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2) = 1.25未満 : 40mg/回、 1.25以上1.50未満 : 50mg/回、 1.5以上 : 60mg/回。

20110831-20

レジメン名称: CDDP+GEM療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	10														
適応	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
シスフラン	80mg/m2	IVDI/1hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+GEM療法

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	11														
適応	非扁平上皮肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
カルボフラン	AUC=5	IVDI/1hr	↓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: GEM1000+CDDP40-q2W療法

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	12
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓															
シスフラチニ	40mg/m2	IVDI/1hr	↓															

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: GEM1000+Cb3-q2W療法

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	13
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓															
カルボフラチニ	AUC=3	IVDI/1hr	↓															

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CPT60+CDDP80-q4W療法

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	14
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 28
イリノテカニ	60mg/m2	IVDI/1hr	↓								↓							
シスフラチニ	80mg/m2	IVDI/1hr	↓															

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CPT60+CDDP60-q4W療法

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	15
適応	小細胞肺癌、大細胞神経内分泌癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 28
イリノテカニ	60mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								
シスフラチニ	60mg/m2	IVDI/1hr	↓															

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CPT60+CDDP30-q2W療法

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	16
適応	非小細胞・小細胞肺癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
イリノテカニ	60mg/m2	IVDI/1hr	↓															
シスフラチニ	30mg/m2	IVDI/1hr	↓															

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: GEM1000+NAV25療法

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	17
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~ 28
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓								
ナヘルビン	25mg/m2	IVDI/5min	↓							↓								

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:DOC療法

20110831-34

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	18	
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ドセタキセル	60-70mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:VNR療法

20110831-33

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	19	
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ナヘルビン	25mg/m2	IVDI/bolus	↓							↓									

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:GEM療法

20110831-35

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	20	
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓									

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:CPT-11療法

20110831-36

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	21	
適応	非小細胞・小細胞,大細胞神経内分泌癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
イリ/テカニ	60mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓									

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:Etopo100+CDDP80療法

20100901-1

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	22	
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	21	…	28
エトボ'ジ	100mg/m2	IVDI/1.5hr	↓	↓	↓														
シスフラチニ	80mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※3~4週毎に繰り返す。

レジメン名称:Etopo80+Cb5療法

20100901-3(保留)

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	23	
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	15	…	28
エトボ'ジ	80mg/m2	IVDI/1.5hr	↓	↓	↓														
カルボ'フラン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: ANV療法

診療科名	整理番号呼吸 一 24																		
適応	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
アドリアシン	30mg/m2	IV/bolus	↓																
ニドラン	30mg/m2	IVDI/20min	↓																
フィルテシン	3mg/m2	IV/bolus	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: Pacli-110+ACNU50療法

診療科名	整理番号呼吸 一 25																		
適応	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
パクリタキセル	110mg/m2	IVDI/1.5hr	↓																
ニドラン	50mg/m2	IVDI/15min	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: AMR療法

20110831-37

診療科名	整理番号呼吸 一 26																		
適応	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルセド	40mg/m2	IVDI/bolus	↓	↓	↓														

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP+PEM療法

20110601-16

診療科名	整理番号呼吸 一 27																		
適応	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																
シスプラチン	75mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

※アリムタ投与後、30分経過してからシスプラチンを投与する。

レジメン名称: PEM療法

20110831-38

診療科名	整理番号呼吸 一 28																		
適応	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CBDCA+PEM

20110601-17

診療科名	整理番号呼吸 一 29																		
適応	投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称:PTX+ACNU療法

20101110-01

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA + PTX + Bevacizumab療法

20110309-1

※3~4週毎に繰り返す。

※扁平上皮癌を除く。

※4~6コース後、Bevacizumab単剤療法に移行

レジメン名称:Bevacizumab単剤療法

20110309-11

※3週毎に繰り返す。

※扁平上皮癌を除く。

*ベバシズマブを含む他のレジメンからの切り替えで使用する。

レジメン名称: 胸膜癒着 OK432 + DXR療法

20110831-40

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	33
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1		
トキソルビシン	20mg/m ²	胸腔内	↓		
ビシハニール	5~10KE	胸腔内	↓		

レジメン名称:CDDP+CPT少量 療法

20110831-39

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	34
適応	小細胞肺癌、大細胞神経内分泌癌	投与スケジュール(日)		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ~ 28
イノテカン	60mg/m ²	IVDI/1hr	↓	↓
シスプラチニ	30mg/m ²	IVDI/1hr	↓	↓

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP + PEM + Bevacizumab療法

20111207-21

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 35																	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21		
シスプラチニ	75mg/m2	IVDI/1hr	↓																		
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																		
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20-90min	↓																		

※Bvは初回90分、2回目以降20分以上かけて投与する。

レジメン名称: CBDCA + PEM + Bevacizumab療法

20111207-22

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 36																	
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21		
カルボプラチニ	AUC=5	IVDI/1hr	↓																		
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																		
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20-90min	↓																		

※Bvは初回90分、2回目以降20分以上かけて投与する。

レジメン名称: PEM + Bevacizumab療法

20111207-23

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 37																	
適応	非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫・胸腺腫		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21		
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																		
アハスチン	15mg/kg	IVDI/20min	↓																		

※前治療から続く維持療法用

レジメン名称: CBDCA+S-1 療法

20121003-03

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 42																	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21		
TS-1	40-60mg/回	PO	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2
カルボプラチニ	AUC=5	IVDI/1hr	↓																		

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2) = 1.25未満 : 40mg/回、 1.25以上1.50未満 : 50mg/回、 1.5以上 : 60mg/回。

レジメン名称: CDDP+VNR 療法

20121003-04

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 43																	
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21		
ナベルビン	25mg/m2	IVDI/bolus	↓																		
シスプラチニ	80mg/m2	IVDI/1hr	↓																		

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: ランマーク 療法

20130403-01

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	44	
適応	骨病変														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ランマーク	120mg/body	S.C.	↓																

レジメン名称: CBDCA+nab-PAC 療法

20130703-01

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	45	
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
アブラキサン	100mg/m2	IVDI/30min	↓								↓								
カルホフラチン	AUC=6	IVDI/1hr	↓															↓	

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: 【2週】Nivolumab (240mg/body) 療法

20160106-01

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	58
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
オブジーホ	240mg/body	IVDI/30min	↓															

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: 【4週】Nivolumab (480mg/body) 療法

20171004-01

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	58	
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
オブジーホ	480mg/body	IVDI/30min	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA+CPT-11 療法

20151202-05

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	59	
適応	小細胞肺癌,大細胞神経内分泌癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
イリノテカン	50mg/m2	IVDI/1hr	↓								↓								
カルホフラチン	AUC=4	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: Ramucirumab + DTX 療法

20160803-02

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	60	
適応	非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
サイラムサ	10mg/kg	IVDI/1hr	↓																
トセタキセル	60mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※PVCフリー(フィルター付)投与ルート使用(タンパク質透過型0.2 μ mフィルターが必要)。

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: 【3週】Pembrolizumab 療法

20170201-01

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	61
適応																		

適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:【6週】Pembrolizumab 療法

20170201-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	61														
投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	42
キトルーダ	400mg/body	IVDI/30min	↓																

※6週毎に繰り返す。

レジメン名称:Atezolizumab 療法

201780404-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	62														
投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30-60min	↓																

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:durvalumab 療法→2023年12月の申請にて、4

週ごとレジメンへ変更(添付文書改訂)

20180606-02

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	63														
投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
イミフィンジ	10mg/kg	IVDI/1hr	↓																

※最長12ヵ月またはPDIになるまで

レジメン名称:Nivolumab (240mg/body) 療法

20180905-02

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	64														
投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オブジーコ	240mg/body	IVDI/30min	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:ADOC療法

20181107-05

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	65														
投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ドキソルビシン	40mg/m2	IVDI/15min	↓																
シスプラチニ	50mg/m2	IVDI/1hr	↓																
ピンクリスチン	0.6mg/m2	IVDI/全開		↓															
エンドキサン	700mg/m2	IVDI/90min			↓														

※3週毎に繰り返す。12コースまで

※ピンクリスチンは最大1mg/bodyまで

レジメン名称:weekly TC+RT 療法

20181107-6a

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	66
投与スケジュール(日)					

薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
パクリタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr		↓																			
カルボプラチナ	AUC 2	IVDI/1hr		↓																			

※1週毎に繰り返す。6コースまで

レジメン名称: tri-weekly TC+RT 療法

20181107-6b

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	一	67																
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
パクリタキセル	200mg/m2	IVDI/3hr		↓																		
カルボプラチナ	AUC 5	IVDI/90min		↓																		

※3週毎に繰り返す。2コースまで

レジメン名称: CBDCA + RT 療法 (70 over)

20181107-7

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	一	68															
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21		
カルボプラチナ	30mg/m2	IVDI/30min		↓	↓	↓	↓	↓													

※1週毎に繰り返す。4コースまで

※カルボプラチナ投与終了後60分以内に放射線治療開始

レジメン名称: CDDP + DTX + RT 療法 (q4week, day1,8)

20181107-8

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	一	69															
適応	非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28		
ドセタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr		↓						↓											
シスプラチナ	40mg/m2	IVDI/1hr		↓						↓											

※4週毎に繰り返す。2コースまで

レジメン名称: CBDCA + PTX + Bevacizumab + Atezolizumab 療法

20190109-8a

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	一	70																
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30-60min		↓																		
ハクリタキセル	175mg/m2	IVDI/3hr		↓																		
カルボプラチナ	AUC=6	IVDI/30min		↓																		
アバスチン	15mg/kg	IVDI/20-60min		↓																		

※3週毎に繰り返す。

※4~6コース後、Bevacizumab + Atezolizumab療法に移行

レジメン名称: Bevacizumab + Atezolizumab 療法

20190109-8b

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸	一	71																
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30min		↓																		
アバスチン	15mg/kg	IVDI/20min		↓																		

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CBDCA + PTX + Pembrolizumab 療法

20190109-09

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 72															
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
パクリタキセル	200mg/m2	IVDI/3hr	↓																
カルボプラチニ	AUC=6	IVDI/30min	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで

レジメン名称: CBDCA + nab-PAC + Pembrolizumab 療法

20190109-10

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 73															
適応	扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
アフラキサン	100mg/m2	IVDI/30min	↓							↓								↓	
カルボプラチニ	AUC=6	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで

レジメン名称: CBDCA + PEM + Pembrolizumab 療法

20190109-11

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 74															
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																
カルボプラチニ	AUC=5	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。4コース施行後、PEM + Pembrolizumab療法(維持療法)へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CDDP + PEM + Pembrolizumab 療法

20190109-12

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 75															
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																
シスプラチニ	75mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に繰り返す。4コース施行後、PEM + Pembrolizumab療法(維持療法)へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: PEM + Pembrolizumab 療法

20190109-13

診療科名	呼吸器内科		整理番号	呼吸 一 76															
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
アリムタ	500mg/m2	IVDI/10min	↓																

※3週毎に繰り返す。

※CBDCA + PEM + Pembrolizumab 療法、CDDP + PEM + Pembrolizumab 療法後の維持療法

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CBDCA + ETP + Atezolizumab (5/100/1200)療法 20190904-04

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	93
適応	進展型小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓														
エトボシド	100mg/m ²	IVDI/1hr	↓	↓	↓												
カルボプラチナ	AUC=5	IVDI/1hr	↓														

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、Atezolizumab 維持療法へ続く

レジメン名称: Atezolizumab 維持療法

20190904-05

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	94
適応	進展型小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30min	↓														

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称: CDDP + PEM + Atezolizumab療法

20200108-06

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	95
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓														
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓														
シスプラチナ	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓														

※3週毎に4~6コース施行後、PEM + Atezolizumab 維持療法へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

※アリムタ投与後、30分経過してからシスプラチナを投与する。

レジメン名称: CBDCA + PEM + Atezolizumab療法

20200108-07

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	96
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓														
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓														
カルボプラチナ	AUC=6	IVDI/1hr	↓														

※3週毎に4~6コース施行後、PEM + Atezolizumab 維持療法へ続く

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: PEM + Atezolizumab 維持療法

20200108-08

診療科名	呼吸器内科													整理番号	呼吸	一	97
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌													投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 ~ 21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓														
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓														

※3週毎に繰り返す。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CBDCA + nab-PAC + Atezolizumab 療法

20200205-01

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	98	
適応	非扁平非小細胞肺癌(進行・再発)														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
テセントリク	1200mg/body	IVDI/60-30min	↓																
アブラキサン	100mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓									↓
カルボプラチニ	AUC=6	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に4~6コース繰り返す。

レジメン名称: Necitumumab + GEM + CDDP 療法

20200408-1

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	99	
適応	扁平上皮非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ポートラーザ	800mg/body	IVDI/60min	↓								↓								
ケムシタピン	1250mg/m ²	IVDI/30min	↓								↓								
シスプラチニ	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に6コースまで繰り返す。

※ポートラーザが400mg/bodyの時は全量250mLに調製

レジメン名称: Necitumumab + GEM + CDDP 療法

20200408-2

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	100	
適応	扁平上皮非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ポートラーザ	800mg/body	IVDI/60min	↓							↓									

※ポートラーザが400mg/bodyの時は全量250mLに調製

レジメン名称: CDDP + ETP + Durvalmab 療法

20201007-02

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	101	
適応	進展型小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
エトホシト	80-100mg/m ²	IVDI/60min	↓	↓	↓														
シスプラチニ	80mg/m ²	IVDI/60min	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、Durvalmab 維持療法へ続く

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: CBDCA + ETP + Durvalmab 療法

20201007-03

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	102	
適応	進展型小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																
エトホシト	80-100mg/m ²	IVDI/60min	↓	↓	↓														
カルボプラチニ	AUC=5-6	IVDI/60min	↓																

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、Durvalmab 維持療法へ続く

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: Durvalmab 療法

20201007-04

※4週毎に繰り返す。

※体重30kg以下の場合は、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: CBDCA + PTX + Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210107-02

レジメン名称: CDDP + PEM + Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210106-03

※1コース終了後、Nivolumab + Ipilimumabのみ

レジメン名称: CBDCA + PEM + Niyolumab + Ipilimumab 療法

20210106-04

※1コース終了後、Nivolumab + Ipilimumabのみ

レジメン名称: Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210106-05

レジメン名称:【CA020-16】weekly CBDCA

· 20210106-06

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	108
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)			

レジメン名称: RAM単剤 療法

20210407-04

※Erlotinib またはGefitinibと併用

レジメン名称:Nivolumab + Ipilimumab 療法

20210707-01

レジメン名称:アブラキサン単剤療法

20230301-01

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	-	115
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3
アブラキサン	100mg/m2	IVDI/30min	↓		

※ weekly 投与

*アブラキサン1vあたり生食20mLで溶解し、空にした生食のボトルに充填

レジメン名称: CDDP+PEM+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle)

20230607-02

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[PEM維持 + Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM+CBDCA+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle)

20230607-03

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[PEM維持 + Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM維持+Durvalmab+Tremelimumab 療法(5+6cycle)

20230607-04

診療科名	呼吸器内科												整理番号	呼吸 一 118					
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌												投与スケジュール(日)						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	～	29	30	31	32	33	34	35	～	56
ヘムトレキセド	500mg/m ²	IVDI/10min	↓								↓								
イミフインジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓								↓								
イシュト	75mg/body	IVDI/60min									↓								

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※プラチナ併用レジメンを4コース施行後の維持療法(5, 6cycle目)。7cycle以降はPEM+Durvalmab療法。

*シジドは維持療法移行後、5cycle目は無、6cycle目のみ投与(投与スケジュールがわかりづらいため、レジメンは5+6cycleの56日間として承認)

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM維持+Durvalmab(4週毎)

20230607-05

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※PEM維持+Durvalmab+Tremelimumab 療法(5+6cycle)から移行。7cycle目より使用レジメン。

※7cycle目以降の維持療法は4週毎。PDまで。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: GEM+CDDP+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle)

20230607-06

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: GEM+CBDCA+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle)

20230607-07

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法 [Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)] へ移行。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称:nab-PTX+CBDCA+Durvalmab+Tremelimumab 療法(1-4cycle) 20230607-08

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※3週毎に繰り返す。4コースまで施行後、維持療法[Durvalmab + Tremelimumab 療法(5+6cycle)]へ移行。

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: Durvalmab+Tremelimumab 療法(5+6cycle)

20230607-09

※切除不能な進行・再発患者の1st lineで使用

※プラチナ併用レジメンを4コース施行後の維持療法(5, 6cycle目)。7cycle以降はDurvalmab単剤療法。

*イジドは維持療法移行後、5cycle目は無、6cycleのみ投与(投与スケジュールがわかりづらいため、レジメンは5+6cycleの56日間として承認)

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: PEM+CDDP+Nivolumab (NAC) 療法

20230607-10

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで

レジメン名称・PEM+CBDCA+Nivolumab(NAC)療法

20230607-11

ヘムトレキセド ^a オフシーホ	500mg/m ² 360mg/body	IVDI/10min IVDI/30min	↓ ↓								
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※CBDCAは基本的にはAUC=5で使用予定

レジメン名称: GEM+CDDP+Nivolumab (NAC) 療法

20230607-12

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※GEMは基本的には $1000\text{mg}/\text{m}^2$ で使用予定

レジメン名称: GEM+CBDCA+Nivolumab (NAC) 療法

20230607-13

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※CBDCAIは基本的にはAUC=5、GEMは基本的には1000mg/m²で使用予定

レジメン名称:PTX+CBDCA+Nivolumab(NAC)療法

20230607-14

※術前化学療法として使用

※3週毎に繰り返す。3コースまで。

※CBDCAは基本的にはAUC=5で使用予定

レジメン名称:T-DXd療法

20231004-04

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	129														
適応	HER2陽性の手術不能または再発の非小細胞癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21

エンハーツ	5.4mg/kg	IVDI/30-90min	↓											
-------	----------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※投与時間は、基本は初回90分、2回目以降30分とする。

※2nd line以降。PDまで。

レジメン名称: 化学放射線療法後のDurvalmab維持療法

20231206-04

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	130														
適応	非小細胞肺癌(化学放射線療法後)	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																

※最長12ヵ月またはPDになるまで

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称: CDDP + PEM + Pembrolizumab(NAC)療法

20241002-04

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	131														
適応	非扁平上皮非小細胞肺癌																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
アリムタ	500mg/m ²	IVDI/10min	↓																
シスフラチニ	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※NACとして3週毎に4コース施行。術後はPembrolizumab療法(術後療法)。

※葉酸及びビタミンB12をアリムタ投与の最低1週間以上前から投与し、アリムタの最終投与日から22日目まで継続する。

投与例 パンビタノン末 1g/日 PO , ビタミンB12注 1mg/9weeks IM

レジメン名称: CDDP + GEM + Pembrolizumab(NAC)療法

20241002-05

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	132														
適応	扁平上皮非小細胞肺癌																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																
ゲムシタビン	1000mg/m ²	IVDI/30min	↓																
シスフラチニ	75mg/m ²	IVDI/1hr	↓																

※NACとして3週毎に4コース施行。術後はPembrolizumab療法(術後療法)。

レジメン名称: 【3週】Pembrolizumab(術後補助)療法

20241002-06

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	133														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
キイトルーダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																

※3週毎に繰り返す。(13コース)

※CDDP + PEM + Pembrolizumab(NAC)療法、CDDP + GEM + Pembrolizumab(NAC)療法施行後の手術療法後のAdj治療

レジメン名称: 【6週】Pembrolizumab(術後補助)療法

20241002-07

診療科名	呼吸器内科	整理番号	呼吸	一	134														
適応	非小細胞肺癌	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	42
キイトルーダ	400mg/body	IVDI/30min	↓																

※6週毎に繰り返す。(7コース)

※CDDP + PEM + Pembrolizumab(NAC)療法、CDDP + GEM + Pembrolizumab(NAC)療法施行後の手術療法後のAdj治療

レジメン名称:PEM+CBDCA+Amivantamab療法(1サイクル目:80kg未満) 20241204-03

診療科名	呼吸器内科			整理番号	呼吸 一 135															
適応	EGFR遺伝子エクソン20変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 オシメルチニブ後のEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/60min	↓																	
ヘメトレキセト	500mg/m2	全開	↓																	
ライブリバント	350mg/body	下記参照	↓																	
ライブリバント	1050mg/body	下記参照		↓																
ライブリバント	1400mg/body	下記参照										↓							↓	

※ライブリバント投与速度に関して

day1: 50mL/hで開始。2時間以降75mL/hに速度up可

day2: 33mL/hで開始。2時間以降50mL/hに速度up可

day8: 65mL/h、day15: 85mL/h

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッカー、H2ブロッcker、DEX使用

レジメン名称:PEM+CBDCA+Amivantamab療法(2サイクル目:80kg未満) 20241204-04

診療科名	呼吸器内科			整理番号	呼吸 一 136															
適応	EGFR遺伝子エクソン20変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 オシメルチニブ後のEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/60min	↓																	
ヘメトレキセト	500mg/m2	全開	↓																	
ライブリバント	1400mg/body	125mL/h(約2hr)	↓																	

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッcker、DEX使用

レジメン名称:PEM+CBDCA+Amivantamab療法(3-4サイクル目:80kg未満) 20241204-05

診療科名	呼吸器内科			整理番号	呼吸 一 137															
適応	EGFR遺伝子エクソン20変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 オシメルチニブ後のEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌			投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/60min	↓																	
ヘメトレキセト	500mg/m2	全開	↓																	
ライブリバント	1750mg/body	125mL/h(約2hr)	↓																	

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッcker、DEX使用

レジメン名称:PEM+Amivantamab療法(5サイクル目以降:80kg未満) 20241204-06

診療科名	呼吸器内科			整理番号	呼吸 一 138	
------	-------	--	--	------	----------	--

※前投薬：アセトアミノフェン、H1ブロッカー、DEX使用

※ライフリバント投与速度について

day1: 50mL/hで開始。2時間以降75mL/hに速度up可

day2: 25mL/hで開始。2時間以降50mL/hに速度up可

day8:65mL/h, day15:85mL/h

※前投薬：アセトアミノフェン、H1ブロッカー、H2ブロッcker、DEX使用

※前投薬：アセトアミノフェン、H1ブロッカー、DEX使用

ライブリバント	2100mg/body	125mL/h(約2hr)	↓											
---------	-------------	---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※前投薬:アセトアミノフェン、H1プロッカー、DEX使用

レジメン名称:PEM+Amivantamab療法(5サイクル目以降:80kg以上) 20241204-10

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	142	
適応	EGFR遺伝子エクソン20変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 オシメルチニブ後のEGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌															投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ペメトレキセド	500mg/m ²	全開	↓																
ライブリバント	2100mg/body	125mL/h(約2hr)	↓																

※前投薬:アセトアミノフェン、H1プロッcker、DEX使用

レジメン名称:Durvalmab(1500)療法(【LD小細胞】2年間) 20250507-08

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	143	
適応	限局期小細胞肺癌 (化学放射線療法後)															投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/60min	↓																

※最長24カ月

※体重30kg以下の場合、イミフィンジ20mg/kg

レジメン名称:Tarlatamab療法(1サイクル目) 20250507-09

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	144	
適応	再発小細胞肺癌															投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
イムテトラ	1mg/body	IVDI/60min	↓																
イムテトラ	10mg/body	IVDI/60min								↓								↓	

※副作用等の理由による休薬後に本剤を再開する場合の用量は添付文書等参照

※PVC、ポリオレフィン又はポリウレタン製の輸液チューブ及びカテーテル材料を使用

※day1,8は前投薬としてDEX投与

レジメン名称:Tarlatamab療法(2サイクル目以降) 20250507-10

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	145	
適応	再発小細胞肺癌															投与スケジュール(日)			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
イムテトラ	10mg/body	IVDI/60min	↓																

※副作用等の理由による休薬後に本剤を再開する場合の用量は添付文書等参照

※PVC、ポリオレフィン又はポリウレタン製の輸液チューブ及びカテーテル材料を使用

レジメン名称:Amivantamab+Lazertinib療法(1サイクル目:80kg未満) 20250604-08

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸	一	146
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	----	---	-----

適応	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
	薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	～	15	～	22	～
ラズ'クルース [®]	240mg/body	po	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ライブリハント	350mg/body	下記参照	↓																
ライブリハント	700mg/body	下記参照		↓															
ライブリハント	1050mg/body	下記参照								↓					↓		↓		↓

※ライブリハント投与速度に関して

day1: 50mL/hで開始。2時間以降75mL/hに速度up可

day2: 50mL/hで開始。2時間以降75mL/hに速度up可

day8: 85mL/h、day15,22: 125mL/h

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッカー、H2ブロッcker、DEX使用

レジメン名称: Amivantamab+Lazertinib療法(2サイクル目以降: 80kg未満) 20250604-08A

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸 一 147			
適応	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ラズ'クルース [®]	240mg/body	po	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ライブリハント	1050mg/body	125mL/hr	↓																

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッcker使用

レジメン名称: Amivantamab+Lazertinib療法(1サイクル目: 80kg以上) 20250604-09

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸 一 148			
適応	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	～	15	～	22	～	28
ラズ'クルース [®]	240mg/body	po	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ライブリハント	350mg/body	下記参照	↓																
ライブリハント	1050mg/body	下記参照		↓															
ライブリハント	1400mg/body	下記参照								↓					↓		↓		↓

※ライブリハント投与速度に関して

day1: 50mL/hで開始。2時間以降75mL/hに速度up可

day2: 35mL/hで開始。2時間以降50mL/hに速度up可

day8: 65mL/h、day15: 85mL/h、day22: 125mL/h

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッcker、H2ブロッcker、DEX使用

レジメン名称: Amivantamab+Lazertinib療法(2サイクル目以降: 80kg以上) 20250604-09A

診療科名	呼吸器内科														整理番号	呼吸 一 149			
適応	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌														投与スケジュール(日)				
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ラズ'クルース [®]	240mg/body	po	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
ライブリハント	1400mg/body	125mL/hr	↓																

※前投薬: アセトアミノフェン、H1ブロッcker使用