

【4】消化器内科

レジメン名称: GEM療法

20110803-26

診療科名	消化器内科	整理番号															消内	—	3	
適応	膵癌、胆道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓							↓			

※3週連続投与後1週休薬する。その後投与を繰り返す。

レジメン名称: アイエーコール肝動注療法

20131204-10

診療科名	消化器内科										整理番号		消内		—		4			
適応	肝細胞癌										投与スケジュール(日)									
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
アイエーコール	65mg/m2	肝動注	↓																	

レジメン名称: CDDP(40)毎週療法

20140108-01

診療科名		消化器内科										整理番号		消内		—		5				
適応		胃癌										投与スケジュール(日)										
薬剤名		投与量		投与方法		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
シスプラチン		40mg/m2		IVDI/2hr		↓																

※喉頭温存のdCRTと、術後補助化学放射線療法のCRTに利用する

※7コースまで

レジメン名称: sLV5FU2療法

20110831-45

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		6		
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
レボホリナート	200mg/m2	IVDI/2hr	↓																
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																
5-FU	2400mg/m2	インフューザー/46hr	↓	→	→														

※2週毎に繰り返す。

20100106-5

[illegible]

※2週毎に繰り返す。

※痛み、運動障害を伴うしびれのある時はオキサリプラチンの減量又は中止。

20161102-01

レジメン名称: FOLFIRI療法

20110831-41

[illegible]

※2週毎に繰り返す。

※下痢のある時はイリテカの投与は行わない。

レジメン名称: CPT-11 (biweekly) 療法

20110831-47.48

[illegible]

※イリノカン[®]は最大180mg/m²使用することがある。

レジメン名称:TS-1療法

20110803-29

[illegible]

※28日間投与後、14日間休薬する。副作用などにより、14日投与、7日休薬とすることもある。

※Adjuvantの場合、8コースまで

※体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、 1.25以上1.50未満 : 50mg/回、 1.5以上 : 60mg/回

レジメン名称:TS-1/DTX療法

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		13	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
TS-1	40～60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2				
ドセタキセル	40mg/m2	IVDI/1.5hr	↓																			
(生食250mLに希釈)																						

※4週毎に繰り返す。

※体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回。

レジメン名称:S-1/CDDP療法

20120606-07

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		14													
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																											
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	～	21	22	～	28	…	35											
TS-1	40～60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2														
シスプラチン	60mg/m2	IVDI/2hr									↓																			
(生食500mLに希釈)																														

※TS-1は、21日間投与後、14日間休薬する。

ただし、術前化学療法の場合21日間投与後、7日間休薬の4週で1コースとし、6コース行う。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回。

※CDDPの投与はday8を基本とするが、前後7日までの日付変更を可とする。

20091007-5

20130501-06

レジメン名称:FL (RPMI)療法

診療科名	消化器内科		整理番号												消内		—		15	
適応	胃癌、大腸癌、膵癌、胆道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	～	8	～	15	～	22	～	29	～	36	～	56					
レボホリナート	250mg/m2	IVDI/2hr	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
5-FU	500-600mg/m2	IVDI/(全開)	↓		↓		↓		↓		↓		↓							

※1週間毎に6回投与後2週休薬する。その後投与を繰り返す。

※レボホリナート投与開始1時間後から5-FUを投与開始する。

レジメン名称:CDDP/CPT-11 biweekly療法

20120606-06

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			16		
適応	食道癌、胃癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
イリナテカン (生食250mLに希釈)	60mg/m2	IVDI/1.5hr	↓																						
シスプラチン (生食250mLに希釈)	30mg/m2	IVDI/1hr	↓																						

※2週毎に繰り返す。

※イリナテカンは最大90mg/m²まで投与可。

レジメン名称:DTX(食道)療法

20110803-22

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 ー 19																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ドセタキセル	70mg/m2	IVDI/1hr	↓																

レジメン名称:CDDP(100)3週療法

20140108-02

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 23																
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
シスプラチン	100mg/m2	IVDI/2hr	↓																

※喉頭温存のdCRTと、術後補助化学放射線療法のCRTに利用する

※3回まで

レジメン名称:weekly PTX療法

20110831-49

診療科名	消化器内科	整理番号														消内	—	20		
適応	胃癌、食道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
パクリタキセル	80mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓							↓			

※1週間毎に3回投与後1週休薬する。その後投与を繰り返す。

レジメン名称:GEM/DTX療法

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		24			
適応	原発不明癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	～	21	…	28	
ゲムシタビン (5%ブドウ糖50mLに希釈)	800mg/m ²	IVDI/30min	↓							↓										
トセタキセル (生食250mLに希釈)	60mg/m ²	IVDI/1hr								↓										

※3～4週毎に繰り返す。

レジメン名称:IRIS(大腸)療法

20110601-27

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 ー 27																
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
イリナカン	125mg/m2	IVDI/1.5hr	↓															↓	
TS-1	40～60mg/回	PO	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2		

※4週毎に繰り返す。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2)＝ 1.25未満：40mg/回、1.25以上1.50未満：50mg/回、1.5以上：60mg/回

レジメン名称:Cmab 単剤療法、Cmab単剤(頭頸部)療法

20110601-23

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		29		
適応	大腸癌、頭頸部癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7										
アービタックス (初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)	250mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※1週毎に繰り返す。

レジメン名称:Cmab(weekly)+CPT-11療法

20110601-24

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			30		
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
アービタックス	250mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓															
(初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)																									
イリナテカン	150mg/m2	IVDI/1.5hr	↓																						

※2週毎に繰り返す。

※イリナテカンは最大180mg/m2まで使用することがある。

レジメン名称:XELOX療法

20091007-3

診療科名	消化器内科	整理番号	消内	—	31														
適応	大腸癌(結腸・直腸)	投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21
ゼーラダ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓			
オキサリプラチン	130mg/m2	IVDI/2hr	↓																

レジメン名称:XELOX+Bv療法

20091007-4

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		32			
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21	
セロータ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
アバستن	7.5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																	
オキサリプラチン	130mg/m2	IVDI/2hr	↓																	

レジメン名称:FOLFIRI+Bv療法

20100106-4 20161102-02

診療科名	消化器内科		整理番号										消内										—										33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:FOLFOX+Bv療法

20100106-6

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			34		
適応	大腸癌（結腸・直腸）		投与スケジュール（日）																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
アバスタチン	5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																						
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																						
（5%ブドウ糖200mLに希釈）																									
オキサリプラチン	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																						
（5%ブドウ糖250mLに希釈）																									
5-FU	400mg/m2	IVDI/（全開）	↓																						
（5%ブドウ糖50mLに希釈）																									
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																				
（生食で希釈・インフューザー使用）																									

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:パニツムマブ単独療法

20100804-9

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			36		
適応	結腸・直腸癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
ベクティビックス	6mg/kg	IVDI/60-30-15min	↓																						

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:FOLFOX+Pani療法

20100804-10

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		37	
適応	大腸癌（結腸・直腸）		投与スケジュール（日）																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
ベクティビックス	6mg/kg	IVDI/60-30-15min	↓																			
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
(5%ブドウ糖200mLに希釈)																						
オキサリプラチン	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
(5%ブドウ糖250mLに希釈)																						
5-FU	400mg/m2	IVDI/（全開）	↓																			
(5%ブドウ糖50mLに希釈)																						
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																	
(生食で希釈・インフューザー使用)																						

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:FOLFIRI+Pani療法

20100804-11

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			38		
適応	大腸癌（結腸・直腸）		投与スケジュール（日）																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
ベクティックス	6mg/kg	IVDI/60-30-15min	↓																						
レボホリナート （5%ブドウ糖200mLに希釈）	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																						
イリナカン （生食250mLに希釈）	150-180mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																						
5-FU （5%ブドウ糖50mLに希釈）	400mg/m2	IVDI/（全開）	↓																						
5-FU （生食で希釈・インフューザー使用）	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																				

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:FL (RPMI) + Bv療法

20091007-6

診療科名	消化器内科		整理番号												消内				—				39			
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																							
薬剤名	投与量	投与方法	1	—	8	—	15	—	22	—	29	—	36	—	43	—	50	—	56							
アバスタチン	5mg/kg	IVDI/30min	↓				↓				↓				↓											
レボホリナート (5%ブドウ糖200mLに希釈)	250mg/m2	IVDI/2hr	↓		↓		↓		↓		↓		↓													
5-FU (5%ブドウ糖50mLに希釈)	600mg/m2	IVDI/5min	↓		↓		↓		↓		↓		↓													

※5-FUは、レボホリナート投与開始1時間後から開始する。

レジメン名称:FP(700/70)+RT療法

20120606-03

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 40																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
シスプラチン	70mg/m2	IVDI	↓																
5-FU	700mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓													

※4週間毎に2コース行う。

レジメン名称:5-FU + CDDP療法

20120606-04

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 ー 41																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	~	21	...	28
シスプラチン	80mg/m2	IVDI	↓																
5-FU	800mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓												

※術前・術後化学療法の場合、3週間毎に2コース行う。

※根治的化学放射線療法後治療の場合、4週毎に6コース行う。

※進行再発時の化学療法の場合、3-4週間毎にPDまで行う。

レジメン名称:DCF(30/80/800) (Metastatic)療法

20131204-11

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 42																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ドセタキセル	30mg/m2	IVDI/1hr	↓														↓		
シスプラチン	80mg/m2	IVDI/2hr	↓																
5-FU	800mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓												

レジメン名称:5-FU + Nedaplatin 療法

20120606-11

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 43																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
アクトラ	90mg/m2	IVDI/1hr	↓																
5-FU	800mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓												

※4週間毎に6コース行う。

レジメン名称:FLTAX療法

20130501-07

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		44	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28			
パクリタキセル	60mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓							↓					
5-FU	500mg/m2	IVDI/bolus	↓							↓							↓					
レボホリナート	250mg/m2	IVDI/2hr	↓							↓							↓					

※原則として1st lineで使用する。

※4週間毎に行う。

レジメン名称:RTOG (FP (1000/75) +RT)療法

20120606-05

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 45																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
シスプラチン	75mg/m2	IVDI/2hr	↓																
5-FU	1000mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓													

※投与量の異なる類似レジメン有り。本レジメンは、RT50.4Gyを行う際の投与量。

レジメン名称:胆道GC療法

20111207-24

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		46		
適応	胆道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
シスプラチン	25mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓										
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓										

レジメン名称:DCF(70/70/750)療法

20120606-01

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		47		
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
ドセタキセル	70mg/m2	IVDI/1hr	↓																	
シスプラチン	70mg/m2	IVDI/2hr	↓																	
5-FU	750mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓													

※ドセタキセル及びシスプラチンの最大投与量は75mg/m²とする。

※3週毎に3コース実施する。

レジメン名称:DCS(40/60/80)療法

20120606-02

診療科名	消化器内科		整理番号											消内							—		48	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																					
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28					
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2						
ドセタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr	↓																					
シスプラチン	60mg/m2	IVDI/2hr	↓																					

※TS-1は、14日間投与後、14日間休薬する。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回。

レジメン名称:XP療法

20120606-08

診療科名	消化器内科		整理番号																	消内	—	49
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
シスプラチン	80mg/m2	IVDI/2hr	↓																			
ゼローダ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓				

※3週毎に6コース実施する。

※ゼローダは開始日の夕食後より内服開始

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.36未満 : 1200mg/回、1.36以上1.66未満 : 1500mg/回

1.66以上1.96未満 : 1800mg/回、1.96以上 : 2100mg/回

レジメン名称:XP+Herceptin療法

20120606-09

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 50																
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ハーセプチン	6mg/kg(初回 は8mg/kg)	IVDI/90-30min	↓																
シスプラチン	80mg/m2	IVDI/2hr	↓																
ゼローダ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	

※3週毎に6コース実施する。

※ゼローダは開始日の夕食後より内服開始

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

体表面積(m2)=1.36未満:1200mg/回、1.36以上1.66未満:1500mg/回

1.66以上1.96未満:1800mg/回、1.96以上:2100mg/回

レジメン名称:Cmab(biweekly)+CPT-11療法

20110601-25

診療科名	消化器内科																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

※2週毎に繰り返す。

※イリナテカンは最大180mg/m2まで使用することがある。

レジメン名称:FOLFIRI+Cmab療法

20110831-43

20110601-26

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		52	
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
アービタックス (初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)	250mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓												
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
イリナテカン	150-180mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																			
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																			
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																	

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:DTX(胃)療法

20110803-23

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 54																
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ドセタキセル	60mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※ドセタキセルは最大75mg/m2使用

レジメン名称:CPT-11 (weekly)療法

20110803-25

診療科名	消化器内科	整理番号														消内	—	55		
適応	胃癌、大腸癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
イリノテカン	100mg/m2	IVDI/1.5hr	↓							↓							↓			

レジメン名称:GEM+S-1療法

20110803-27

診療科名	消化器内科		整理番号																	消内	—	56
適応	膵癌/胆道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓												
TS-1	60～100mg/日	PO	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2					

※TS-1の投与量(1段階減量)は以下のとおり。

体表面積(m2)=1.25未満:60mg/日、1.25以上1.50未満:80mg/日、1.50以上:100mg/日

レジメン名称:Sorafenib療法

20110803-30

診療科名	消化器内科		整理番号														消内	ー	58
適応	肝臓		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	～		
ネクサバル	400mg/body/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	

※連日服用。

※食前1時間、食後2時間を避けて服用。

レジメン名称:FOLFOX+Cmab療法

20110831-44

診療科名	消化器内科		整理番号										消内				ー		59
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
アビタックス (初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)	250mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓									
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																
オキサリプラチン	85-100mg/m2	IVCI/2hr	↓																
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→														

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:CPT-11+Pmab療法

20110831-50

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		60		
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
ベクティックス	6mg/kg	IVDI/60-30-15min	↓																	
イリナテカン	150mg/m2	IVDI/1.5hr	↓																	

※2週毎に繰り返す。

※イリナテカンは最大180mg/m2まで使用することがある。

レジメン名称:Xeloda療法

20110831-51

診療科名	消化器内科		整理番号																	消内	—	61
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
ゼローダ	1500-2400mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2				

※3週毎に繰り返す。

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

BSA <1.33:1500mg/回, 1.33≤1.57:1800mg/回, 1.57≤1.81:2100mg/回, 1.81≤:2400mg/回

レジメン名称:Xeloda+Bv療法

20110831-52

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		62	
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
ゼーロード	1500-2400mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2				
アバスチン	7.5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

BSA <1.33:1500mg/回, 1.33≤1.57:1800mg/回, 1.57≤1.81:2100mg/回, 1.81≤:2400mg/回

レジメン名称:HER(胃癌)療法

20111207-25

診療科名	消化器内科		整理番号											消内					—					63	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21						
ハーセプチン	6mg/kg(初回は8mg/kg)	IVDI/90-30min	↓																						

レジメン名称:Weekly PTX療法

20111207-27

診療科名	消化器内科		整理番号												消内		—		65	
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	~	8	~	15	~	22	~	29	~	36	~	49					
パクリタキセル	100mg/m2	IVDI/1hr	↓		↓		↓		↓		↓		↓							

レジメン名称:FOLFOX(アレルギーレジメン)療法

20120307-01

診療科名	消化器内科		整理番号											消内		—		66	
適応	大腸癌、小腸癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オキサリプラチン	85mg/m2	IVDI/4hr	↓																
レボホリナート	200mg/m2	IVDI/2hr	↓																
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																
5-FU	2400mg/m2	インフューザー/46hr	↓	→	→														

※2週毎に繰り返す。

※アレルギーレジメンのため、通常とは支持療法、投与時間が異なる。

※レボホリナートはL-OHP開始2時間後から並列で投与、2時間かけて。

レジメン名称:FOLFOX(アレルギーレジメン)+Bv療法

20120307-02

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		67
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
アバスタチン	5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																		
オキサリプラチン	85mg/m2	IVCI/4hr	↓																		
(5%ブドウ糖250mLに希釈)																					
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																		
(5%ブドウ糖200mLに希釈)																					
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																		
(5%ブドウ糖50mLに希釈)																					
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																
(生食で希釈・インフューザー使用)																					

※2週毎に繰り返す。

※アレルギーレジメンのため、通常とは支持療法、投与時間が異なる。

※レボホリナートはL-OHP開始2時間後から並列で投与、2時間かけて。

レジメン名称:XELOX(アレルギーレジメン)療法

20120307-03

診療科名	消化器内科		整理番号											消内		—		68		
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21	
セロータ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
オキサリプラチン	130mg/m2	IVDI/4hr	↓																	

※アレルギーレジメンのため、通常とは支持療法、投与時間が異なる。

レジメン名称:XELOX(アレギー-レジメン)+Bv療法

20120307-04

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		69	
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21			
セローダ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
アバスチン	7.5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																			
オキサリプラチン	130mg/m2	IVDI/4hr	↓																			

※アレギー-レジメンのため、通常とは支持療法、投与時間が異なる。

レジメン名称:5-FU+MMC療法

20120307-05

診療科名	消化器内科		整理番号											消内							70	
適応	肛門癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28			
マイトマイシンC	10mg/m2	IVDI/bolus	↓																			
5FU	1000mg/m2	IVDI/持続	↓	↓	↓	↓																

レジメン名称:FOLFIRINOX療法

20121107-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
適応	膵癌		投与スケジュール(日)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

レジメン名称:DCS(70/70/65)(頭頸部)療法

20130501-02

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 73																	
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
TS-1	60～100mg/日	PO	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2		
ドセタキセル	70mg/m2	IVDI/1hr	↓																	
シスプラチン	70mg/m2	IVDI/2hr	↓																	

※TS-1は、14日間投与後、7日間休薬する。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2)=1.25未満:60mg/日、1.25以上1.50未満:80mg/日、1.50以上:100mg/日

レジメン名称:FP(1000/100)+Cmab療法

20130501-03

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		74		
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
アークタックス (初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)	250mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								↓		
シスプラチン	100mg/m2	IVDI/2hr	↓																	
5-FU	1000mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓														

レジメン名称: CBDCA+PTX+Cmab療法

20130501-04

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		75		
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
パクリタキセル	100mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓										
カルボプラチン	AUC2.5	IVDI/30min	↓							↓										
アークタックス (初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)	250mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								↓		

レジメン名称:S-1+DTX療法

20130501-08

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		76	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓				
ドセタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr	↓																			

※TS-1は、day1の夕食後からday15の朝食後まで服用し、day21まで休薬する。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2) = 1.25未満:40mg/回、1.25以上1.50未満:50mg/回、1.5以上:60mg/回。

レジメン名称:FOLFOXIRI+Bv療法

20131204-08

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		79	
適応	大腸がん		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
アバスタチン	5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																			
イリナテカン (5%ブドウ糖250mLに希釈)	165mg/m2	IVCI/1hr	↓																			
レボホリナート (5%ブドウ糖200mLに希釈)	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
オキサリプラチン (5%ブドウ糖250mLに希釈)	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
5-FU (生食で希釈・インフューザー使用)	3200mg/m2	IVCI/48hr	↓	→	→																	

※インフューザーポンプはLV5を使用し、全量を230mLに調製(用量、時間、粘稠性を考慮)

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:mFOLFIRINOX(bolusなしCPT150)療法

20131204-09

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		80		
適応	膵癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オキサリプラチン (5%ブドウ糖250mLに希釈)	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																
レボホリナート (5%ブドウ糖200mLに希釈)	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																
イリナテカン (5%ブドウ糖250mLに希釈)	150mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																
5-FU (生食で希釈・インフューザー使用)	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→														

※インフューザーポンプはSV2.5を使用し、全量を100mLに調製(用量、時間、粘稠性を考慮)

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:5-FU+CBDCA+Cmab療法

20131204-12

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		81		
適応	頭頸部癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
アービタックス (初回 400mg/m2, IVDI/2hrで投与)	250mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓							↓			
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																	
5-FU	1000mg/m2	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓														

レジメン名称:TAS-102 ロンサーフ療法

20140604-05

診療科名	消化器内科																整理番号	消内		—	83
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28		
ロンサーフ	15～75mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2			↓	2	↓	2	↓	2					

※ロンサーフの投与量は添付文書通り。

レジメン名称:GEM+アブラキサン療法

20150204-01

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—	84			
適応	膵癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28	
アブラキサン	125mg/m2	IVDI/30min	↓							↓								↓		
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓								↓		

※4週毎に使用。

※アブラキサン1vあたり生食20mLで溶解し、空にした生食のボトルに充填

※適正使用ガイドに従い、減量後の再増量可

レジメン名称:FLOX療法

20150204-02

診療科名	消化器内科		整理番号												消内		—		85	
適応	大腸癌、胃癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	～	8	～	15	～	22	～	29	～	36	～	56					
オキサリプラチン	85mg/m2	IVDI/2hr	↓				↓				↓									
レボホリナート	250mg/m2	IVDI/2hr	↓		↓		↓		↓		↓		↓							
5-FU	500mg/m2	IVDI/(全開)	↓		↓		↓		↓		↓		↓							

※5FUは、レボホリナート投与開始から1時間後に投与

レジメン名称:DTIC単剤療法

20150204-03

診療科名	消化器内科	整理番号	消内 — 86																
適応	悪性黒色腫		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
ダカルバジン	1000mg/m2	IVDI/1hr	↓																

※3週毎に使用。

レジメン名称:胃SOX 療法

20150513-02

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 87																
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	
オキサリプラチン	100mg/m2	IVDI/2hr	↓																

※TS-1は、day1の夕食後からday15の朝食後まで服用し、day21まで休薬する。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2) = 1.25未満：40mg/回、1.25以上1.50未満：50mg/回、1.5以上：60mg/回。

レジメン名称:5-FU+STZ(NET)療法

20150513-03

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—	88			
適応	神経内分泌腫瘍		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	42	
5-FU	400mg/m2	IVCI/30min	↓	↓	↓	↓	↓													
ザノサー	500mg/m2	IVDI/30min	↓	↓	↓	↓	↓													

※6週間毎に使用

レジメン名称:weeklyPTX+RAM 療法

20150701-01

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 89																
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
サイラムザ	8mg/kg	IVDI/1hr	↓															↓	
パクリタキセル	80mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								↓	

レジメン名称:RAM単剤 療法

20150701-02

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		90	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
サイラムザ	8mg/kg	IVDI/1hr	↓																			

レジメン名称:GEMOX 療法

20160803-01

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 91																
適応	膀胱癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/100min	↓																
オキサリプラチン	100mg/m2	IVDI/2hr	↓																

※臨床試験用レジメン

※ゲムシタビンは100mg/body未満、オキサリプラチンは10mg/body未満切り捨て

レジメン名称:CDDP+ETP 療法

20161005-01

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		92			
適応	神経内分泌腫瘍		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
エトポシド	100mg/m2	IVDI/1hr	↓	↓	↓															
シスプラチン	80mg/m2	IVDI/1hr	↓																	

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:FOLFIRI+RAM療法

20161005-03

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		93
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
サイラムザ	8mg/kg	IVCI/1hr	↓																		
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																		
イリリテカン	150-180mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																		
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																		
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→	↓															

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:IRI+RAM療法

20170301-02

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			95		
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
サイラムザ [®]	8mg/kg	IVCI/1hr	↓																						
イリノテカン	150mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																						

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:dose dense TC 療法

20170301-03

診療科名	消化器内科		整理番号																	消内		—		96	
適応	原発不明がん		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21						
パクリタキセル	80mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								↓							
カルボプラチン	AUC=5-6	IVDI/1hr	↓																						

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:胃 L-OHP+HER 療法

20170405-01

診療科名	消化器内科		整理番号										消内										—		97
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21						
ハーセプチン	6mg/kg(初回は8mg/kg)	IVDI/90-30min	↓																						
オキサリプラチン	100-130mg/m2	IVDI/2hr	↓																						
TS-1	40mg/m2/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓							
ゼローダ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓							

※3週毎に繰り返す。

※TS-1、ゼローダはいずれかを使用

レジメン名称: 胃XELOX療法

20170510-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		98	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21			
セロータ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓		
オキサリプラチン	100-130mg/m2	IVDI/2hr	↓																			

※ゼローダは開始日の夕食後より内服開始

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

体表面積(m²)=1.36未満:1200mg/回、1.36以上1.66未満:1500mg/回

1.66以上1.96未満:1800mg/回、1.96以上:2100mg/回

レジメン名称: 胃FOLFOX療法

20170510-02

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			99		
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																						
オキサリプラチン	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																						
5-FU	400mg/m2	IVCI/(全開)	↓																						
5-FU	2400mg/m2	インフューザー/46hr	↓	→	→	↓																			

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: TAS102 ロンサーフ+BV 療法

20170705-04

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 100																
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
ロンサーフ	15~75mg/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓		↓	↓	↓	↓	↓	↓				
アバスチン	5mg/kg	IVCI/30-10min	↓														↓		

※ロンサーフの投与量は添付文書通り。

レジメン名称: FOLFOXIRI+RAM療法

20170802-03

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			101		
適応	大腸がん		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
サイラムザ	8mg/kg	IVDI/1hr	↓																			
イリナカン (5%ブドウ糖250mLに希釈)	165mg/m2	IVCI/1hr	↓																			
レボホリナート (5%ブドウ糖200mLに希釈)	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
オキサリプラチン (5%ブドウ糖250mLに希釈)	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
5-FU (生食で希釈・インフューザー使用)	3200mg/m2	IVCI/48hr	↓	→	→																	

※インフューザーポンプはLV5を使用し、全量を230mLに調製(用量、時間、粘稠性を考慮)

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: weekly nab-PTX療法

20170906-01

診療科名	消化器内科		整理番号												消内						102	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28			
アブラキサン	100mg/m2	IVDI/30min	↓							↓							↓					

※1週間毎に3回投与後1週休薬する。その後投与を繰り返す。

レジメン名称:FOLFIRI + aflibercept療法

20170906-02

診療科名	消化器内科		整理番号														消内	—			103
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
aflibercept	4mg/kg	IVCI/60min	↓																		
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																		
(5%ブドウ糖200mLに希釈)																					
イリナカン	150-180mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																		
(生食250mLに希釈)																					
5-FU	400mg/m2	IVCI/(全開)	↓																		
(5%ブドウ糖50mLに希釈)																					
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																
(生食で希釈・インフューザー使用)																					

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:【2週】Nivolumab (240mg/body) 療法

20171004-01

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 104																
適応	胃癌 MSI-H大腸癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オプジーボ	240mg/body	IVDI/30min	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:【4週】Nivolumab (480mg/body) 療法

20171004-01

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 104																
適応	胃癌 MSI-H大腸癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
オブジーボ	480mg/body	IVDI/30min	↓																

※4週毎に繰り返す。

レジメン名称:nab-PTX+RAM 療法

20171101-01

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 105																
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28
サイラムザ	8mg/kg	IVDI/1hr	↓														↓		
アブラキサン	100mg/m2	IVDI/30min	↓							↓							↓		

※アブラキサン1vあたり生食20mLで溶解し、空にした生食のボトルに充填

レジメン名称: SIRB 療法

20171206-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内	—	107		
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21		
TS-1	40-60mg/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓				
アバスチン	7.5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																		
イリノテカン	150mg/m2	IVDI/90min	↓																		

※TS-1は、day1の夕食後からday15の朝食後まで服用し、day21まで休薬する。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m2) = 1.25未満: 40mg/回、1.25以上1.50未満: 50mg/回、1.5以上: 60mg/回。

レジメン名称: XELIRI+BV療法

20180207-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		108	
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21			
セロータ	800mg/m2/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
アバスチン	7.5mg/kg	IVCI/30-10min	↓																			
イリノテカン	200mg/m2	IVDI/90min	↓																			

※ゼローダは開始日の夕食後より内服開始

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

体表面積(m2)=1.31未満:900mg/回、1.31以上1.69未満:1200mg/回

1.69以上2.07未満:1500mg/回、2.07以上:1800mg/回

※UGT1A1:6* ならびに28*のホモ接合もしくはダブルヘテロの場合、イリノテカンは150mg/m2が初期投与量の目安(AXEPT試験)。

レジメン名称:XELOX(小腸adju JCOG1502C) 療法

20180606-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内				—				109			
適応	小腸癌術後(先進B)		投与スケジュール(日)																									
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21									
ゼローダ	1000mg/m2/回	PO	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓												
オキサリプラチン	130mg/m2	IVDI/2hr	↓																									

※ゼローダは開始日の夕食後より内服開始

※ゼローダの投与量は以下のとおり。

体表面積(m2)=1.36未満:1200mg/回、1.36以上1.66未満:1500mg/回

1.66以上1.96未満:1800mg/回、1.96以上:2100mg/回

レジメン名称:胃 FOLFOX(WJOG10517G)

20181107-09

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		110	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
オキサリプラチン	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																			
5-FU	400mg/m2	IVCI/(全開)	↓																			
5-FU	2400mg/m2	インフューザー/46hr	↓	→	→	↓																

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:胆道GCS(CCr $\geq$ 60)療法

20190109-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		111	
適応	胆道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
シスプラチン	25mg/m2	IVDI/1hr	↓																			
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓																			
S-1	40～60mg/回	PO	↓タ	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	朝											

※2週毎に繰り返す。

※S-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回

レジメン名称:【3週】Pembrolizumab(MSI-H)療法

20190109-07

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		113	
適応	MSI-Hを有する固形癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
キイトルダ*	200mg/body	IVDI/30min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

※MSI-Hを有する固形癌(MSI検査キット(FALCO)でMSI-Hと診断)に対し使用

レジメン名称:胃(術前) DOS(40/100/80)療法

20190206-02

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		114	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
TS-1	40-60mg/回	PO	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2					
トセタキセル	40mg/m2	IVDI/1hr	↓																			
オキサリプラチン	100mg/m2	IVDI/2hr	↓																			

※3週毎に3コース繰り返す。

※TS-1は、14日間投与後、14日間休薬する。

※TS-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回。

※治験フォルダに登録

レジメン名称:GEM+S-1(臍NAC Ccr $\geq$ 60)療法

20190403-01

診療科名	消化器内科		整理番号																	消内		—		115	
適応	膵癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21						
ケムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓															
S-1	40~60mg/回	PO	↓	タ	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	2	↓	朝					

※2週毎に繰り返す。2コースまで。

※S-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²) = 1.25未満 : 40mg/回、1.25以上1.50未満 : 50mg/回、1.5以上 : 60mg/回

レジメン名称: GEM+S-1 (臍NAC 60>Ccr≥50)療法

20190403-02

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 116																
適応	臍癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓									
S-1	40~60mg/回	PO	↓タ	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓朝	

※2週毎に繰り返す。2コースまで。

※S-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²)=1.25未満:25mg/回、1.25以上1.50未満:40mg/回、1.50以上:50mg/回

レジメン名称: 胆道GCS(60>CCr>45)療法

20190403-14

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 - 117																
適応	胆道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
シスプラチン	25mg/m2	IVDI/1hr	↓																
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓																
S-1	30～50mg/回	PO	↓タ	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓朝									

※2週毎に繰り返す。

※S-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²)= 1.25未満:(朝40mg、タ20mg)、1.25以上1.50未満:40mg/回、1.5以上:50mg/

レジメン名称: S-IROX 療法

20190403-15

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		118				
適応	臍癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
オキサリプラチン	85mg/m2	IVDI/2hr	↓																
イリノテカン	150mg/m2	IVDI/1.5hr	↓																
S-1	40～60mg/回	PO	↓タ	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓2	↓朝									

※2週毎に繰り返す。

※S-1の投与量は以下のとおり。

体表面積(m²)= 1.25未満:40mg/回、1.25以上1.50未満:50mg/回、1.5以上:60mg/回

レジメン名称: FOLFOX(5-FU 1600mg/m²)-RT療法

20190605-5

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		120	
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
レボホリナート	200mg/m2	IVDI/2hr	↓																			
オキサリプラチン	85mg/m2	IVDI/2hr	↓																			
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																			
5-FU	1600mg/m2	インフューザー/46hr	↓	→	→	↓																

※2週毎に繰り返す。最大6コースまで

レジメン名称: 胃 ロンサーフ療法

20190904-07

診療科名	消化器内科		整理番号																	消内	—	125
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28			
ロンサーフ	15～75mg/回	PO	↓	2	↓	2	↓	2			↓	2	↓	2	↓	2						

※ロンサーフの投与量は添付文書通り。

レジメン名称: Cmap 単剤(隔週)

20191106-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		127	
適応	大腸癌、頭頸部癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
アービタックス (初回 IVDI/2hrで投与)	500mg/m2	IVDI/1hr	↓																			

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: FOLFOX(OHP 85)+Cmap (biweekly) 療法

20191204-02

診療科名	消化器内科		整理番号											消内		—		128	
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
アービタックス (初回 VDI/2hrで投与)	500mg/m2	IVDI/1hr	↓																
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																
オキサリプラチン	85mg/m2	IVCI/2hr	↓																
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→														

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: FOLFIRI(CPT 150)+Cmap (biweekly)療法

20191204-03

診療科名	消化器内科		整理番号														消内			—			129		
適応	大腸癌(結腸・直腸)		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
アービタックス (初回 VDI/2hrで投与)	500mg/m2	IVDI/1hr	↓																						
レボホリナート	200mg/m2	IVCI/2hr	↓																						
イリリガン	150mg/m2	IVCI/1.5hr	↓																						
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																						
5-FU	2400mg/m2	IVCI/46hr	↓	→	→																				

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称: Nivolumab (240mg/body) 療法【食道】

20200304-01

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		130	
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
オプジーボ	240mg/body	IVDI/30min	↓																			

※2週毎に繰り返す。

レジメン名称:nal-IRI+5-FU/LV療法

20200603-3

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		131	
適応	膵癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
レボホリナート	200mg/m2	IVDI/2hr	↓																			
オニパド	70mg/m2	IVDI/90min	↓																			
5-FU	2400mg/m2	インフューザー/46hr	↓	→	→																	
※2週毎に繰り返す。																						

レジメン名称:dose dense TC療法

20200805-04

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—	134			
適応	肛門癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
パクリタキセル	80mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓								↓		
カルボプラチン	AUC=5	IVDI/1hr	↓																	

※最大6サイクル

レジメン名称:【3週】食道Pembrolizumab(CPS≥10) 療法

20200902-1

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		136	
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21			
キイトルダ [®]	200mg/body	IVDI/30min	↓																			

※3週毎に繰り返す。

レジメン名称:胃 T-DERUX療法

20201007-1

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		137	
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
エンハーツ	6.4mg/kg	IVDI/30-90min	↓																			

※投与時間は、基本は初回90分、2回目以降30分とする。

レジメン名称: Atezolizumab +Bevacizumab 療法(肝細胞癌)

20201007-7

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—	138			
適応	肝細胞癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
テセントリク	1200mg/body	IVDI/30-60min	↓																	
アバスタチン	15mg/kg	IVDI/20-90min	↓																	

※3週毎に繰り返す。

※テセントリクの投与時間は、基本は初回60分、2回目以降30分とする。

※アバスタチンの投与時間は、基本は初回90分、2回目以降20分とする。

レジメン名称: Nivolumab (240mg/body) + Ipilimumab (1mg/kg) 療法 20201104-01

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 ー 139																		
適応	MSI-H大腸癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21		
オプジーボ	240mg/body	IVDI/30min	↓																		
ヤーボイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																		

※3週毎に4回使用。

レジメン名称: 胃FOLFOX(L-OHP=85) + Nivo(240) 療法

20211201-02

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		148		
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
レボホリナート	200mg/m2	IVDI/2hr	↓																
オキサリプラチン	85mg/m2	IVDI/2hr	↓																
5-FU	400mg/m2	IVDI/(全開)	↓																
5-FU	2400mg/m2	インフューザー/46hr	↓ →																
ニホルマブ	240mg/body	IDVI/30min	↓																

※2週毎に繰り返す。

※痛み、運動障害を伴うしびれのある時はオキサリプラチンの減量又は中止。

レジメン名称: 胃L-OHP + Nivo療法

20211201-03

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		149			
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	～	14	15	～	21	
ニボルマブ	360mg/body	IDVI/30min	↓																	
オキサリプラチン	100mg/m2	IVDI/2hr	↓																	

※ゼローダorTS-1と併用

※ゼローダ: 1000mg/m2 twice a day

※TS-1: 40mg/m2 twice a day

※L-OHPは、最大130mg/m2まで増量可

レジメン名称: 【3週】Nivolumab (360mg/body) 療法

20211201-04

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 — 150																		
適応	胃癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21		
オプジーボ	360mg/body	IVDI/30min	↓																		

※3週毎に繰り返す。

※胃L-OHP + Nivo療法において、有害事象によりL-OHPが投与できなかった際に使用する。

レジメン名称: 食道FP(800/80)+Pembrolizumab 療法

20211201-05

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		ー		151	
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21			
キイトルダ	200mg/body	IVDI/30min	↓																			
シスプラチン	80mg/m ¹	IVDI/2hr	↓																			
5-FU	800mg/m ²	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓															

※3～4週毎に35コースまで実施する。

※シスプラチンの投与回数は、主治医判断によるものとする

レジメン名称: Bi-weekly ロンサーフ+BV(JCOG2014)

20220105-01

診療科名	消化器内科																整理番号	消内		ー	152
適応	大腸癌（結腸・直腸癌）		投与スケジュール（日）																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
ロンサーフ	35～75mg/回	PO	↓	↓	2	↓	2	↓	2	↓											
アバستن	5mg/kg	IVDI/10-30min	↓																		

※2週毎に繰り返す。

※アバステンの投与時間は、基本は初回30分、2回目以降10分とする。

※ロンサーフは、開始日の夕食後より内服開始

レジメン名称:【HER2】HER+PER 療法

20220406-04

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		ー		153			
適応	HER2陽性の進行・再発の結腸・直腸癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
ハーゼータ	420mg/body (初回は 840mg/body)	IVDI/30min (初回は1hr)	↓																	
ハーセプチン	6mg/kg(初回 は8mg/kg)	IVDI/30min (初回は 90min)	↓																	

レジメン名称: 食道FP(800/80)+Nivolumab 療法

20220601-02

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 ー 156																
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28
ニボルマブ	240mg/body	IVDI/30min	↓														↓		
シスプラチン	80mg/m ²	IVDI/2hr	↓																
5-FU	800mg/m ²	IVDI/24hr	↓	↓	↓	↓	↓												

※PDまで

※ニボルマブ480mgの際は、ニボルマブはDay1のみ投与

レジメン名称:Nivolumab + Ipilimumab 療法(食道)

20220601-03

診療科名	消化器内科		整理番号														消内		—		157	
適応	食道癌		投与スケジュール(日)																			
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	~	15	16	17	18	19	~	29	~	42			
オプジーボ	240mg/body	IVDI/30min	↓								↓						↓					
ヤーボイ	1mg/kg	IVDI/30min	↓																			

※PDまで

※ニボルマブ480mgの際は4週ごとに投与

レジメン名称:RAM単剤(HCC)療法(AFP≥400ng/mL)

20221005-04

診療科名	消化器内科		整理番号											消内		—		158	
適応	肝細胞癌		投与スケジュール(日)																
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
サイラムザ [®]	8mg/kg	IVDI/1hr	↓																

※PDまで

レジメン名称:胆道GC+Durvalumab療法

20230201-4A

診療科名	消化器内科												整理番号	消内		—		160		
適応	胆道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
シスプラチン	25mg/m2	IVDI/1hr	↓							↓										
ゲムシタビン	1000mg/m2	IVDI/30min	↓							↓										
イフィジ	1500mg/body	IDVI/1hr	↓																	

※PDまで

※durvalumabは、体重30kg以下の場合は20mg/kg

レジメン名称:胆道durvalumab(維持)療法

20230201-04B

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		161			
適応	胆道癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	21	
イミフィジ	1500mg/body	IVDI/1hr	↓																	

※PDまで

※durvalumabは、体重30kg以下の場合は20mg/kg

レジメン名称:肝細胞Durvalumab+Tremalimumab(1回目のみ)療法

20230301-2

診療科名	消化器内科		整理番号										消内		—		162			
適応	肝細胞癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	~	28	
イミフィジ	1500mg/body	IVDI/1hr	↓																	
イジウド	300mg/body	IVDI/1hr	↓																	

※1回まで

※Tremalimumabは、体重30kg以下の場合は4mg/kg

※durvalumabは、体重30kg以下の場合は20mg/kg

レジメン名称:肝細胞癌durvalumab単剤療法

20230301-3

診療科名	消化器内科																		整理番号	消内		ー		163	
適応	肝細胞癌		投与スケジュール(日)																						
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	28						
イミフィンジ	1500mg/body	IVDI/1hr	↓																						

※PDまで

※durvalumabは、体重30kg以下の場合は20mg/kg

レジメン名称:PHESGO療法(初回)

20231101-05

診療科名	消化器内科		整理番号	消内		—	171													
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																	
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21	
フェスゴIN	15mL (Per:1200mg) (Tra:600mg)	皮下注/8min 以上 (110mL/h)	↓																	

※皮下注と点滴静注は相互に変更可能

レジメン名称:PHESGO療法(2回目以降)

20231101-06

診療科名	消化器内科		整理番号 消内 - 172																		
適応	大腸癌		投与スケジュール(日)																		
薬剤名	投与量	投与方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	～	21		
フェスゴ [®] MA	10mL (Per:600mg) (Tra:600mg)	皮下注/5min 以上 (120mL/h)	↓																		

※皮下注と点滴静注は相互に変更可能

※6週間以上空いた際は、基本は初回投与量へ