

適応外使用医薬品に関する情報文書

2026 年 5 月 20 日作成 第 1 版

医療の内容	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg の 1 日 2 回投与
対 象 患 者	ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg を服用する患者さん
承認診療科(医師)	循環器内科・心臓外科（所属医師全て）
承認日・期間	2025 年 1 月 7 日 承認日より無期限
概 要	【目的・意義】 冠攣縮性狭心症の予防などにジルチアゼム塩酸塩徐放カプセルを投与しています。体内の薬の血中濃度を安定させ、過度の降圧作用や徐脈発現を抑えるために 1 日 2 回に分けて投与します。 【予想される不利益と対策】 主な副作用として、徐脈、顔面潮紅、めまい、倦怠感、頭痛、頭重感、発疹、胃部不快感、便秘、腹痛、胸やけ、食欲不振、吐き気などが報告されています。1 日 1 回で投与するときと同等かまたは少ないと考えられます。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。
当センターの審査（薬剤委員会および倫理委員会）において承認を受けた上記の治療について、対象者となられる方から同意をいただくことにかえて、病院ホームページにて情報を公開することにより実施しております。 本件について同意できない場合、この内容に関して拒否される場合やご質問がある場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。なお、本件に同意できない場合にあなた自身のへの日常の診療における不利益はありません。	
問合せ先および適応外使用を拒否する場合の連絡先： 〒360-0197 埼玉県熊谷市板井1696 担当医にご連絡ください。 埼玉県立循環器・呼吸器病センター TEL：048-569-9900（代表）	