

【 埼玉県立小児医療センター 散剤賦形量 】

服用回数が 1日2回以上の場合		服用回数が1日1回 あるいは、頓用の場合	
1日量 (1Rp中の製剤量)	賦形剤の量	1回量 (1Rp中の製剤量)	賦形剤の量
0.4g以上	賦形なし	0.2g以上	賦形なし
0.4g未満	0.2g/日	0.2g未満	0.1g/日

※2016年10月より、賦形量を変更しました。
 ※加える賦形剤は、原則、乳糖を使用しています。

例) ラシックス細粒[40mg/g] (成分量) (製剤量)
 1日量 力価 1mg 0.025g
 [分1] 朝食後に服用
 → 1日あたり、乳糖0.1gを加える。

例) ラシックス細粒[40mg/g] (成分量) (製剤量)
 1日量 力価 1mg 0.025g
 ≪分3≫ 朝・昼・夕食後に服用
 → 1日あたり、乳糖0.2gを加える。

例) ラシックス細粒[40mg/g] (成分量) (製剤量)
 アルダクトンA細粒[100mg/g] 1日量 力価 15mg 0.375g
 1日量 力価 15mg 0.15g
 ≪分3≫ 朝・昼・夕食後に服用
 → 賦形剤を加えない。